

분류번호:264
일반의약품



10매입 (10x7cm)


케프로텍[®] 플라스타

COOL

빠르고 시원한 관절염,
근육통 치료제

(케토프로펜 30mg)

3중구조 특수원단 적용
우수한 흡수력 · 부착력





케프로텍[®]플라스타^{COOL}

(케토프로펜 30mg)

[원료약품 및 그 분량] 이 약 10cm 중

케토프로펜(KP) 4.2857mg

[성 상] 이 약은 무색 반투명의 점착성 물질을 실색 부직포에 도포하고(바르코) 고체 면에 바리지를 덮은 첩부제이다.

[효능·효과] 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염)·퇴행성 관절염(골(뼈)관절염), 어깨 관절주위염, 건(힘줄)·건초염(힘줄염·팔꿈치염), 건(힘줄)주위염, 상완골(위팔뼈)상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상(상처) 후의 중창(부기)·동통(통증)

[용법·용량] 약면의 바리지를 떼어낸 후 환부(질환 부위)에 1일 2회 부착한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 광과민증의 병력이 있는 환자 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작의 유발 또는 그 병력이 있는 환자 2) 진통제 사용으로 인한 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로펜산, 페노피브레이트, 벤탁피브레이트, 시프루피브레이트, 옥시벤존(케토프로펜과 교차과민반응을 유발할 수 있다) 4) 임신기간 6개월 이상인 임부 : 임신말기의 젖떼에 이 약을 경구투여한 실험에서 태아의 동맥혈관 수축이 보고되었다. 임신후기에 투여(경구, 주사, 직장(궁창차)주입)시 지속성 태아손환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있다. 5) 15세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 1) 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있다) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 임부 또는 수유부(안정성이 확립되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용은 피한다.)

3. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 가능한 한 이 첩부제를 소지할 것 1) 드물게 속, 아나필락시양 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성 유사증상)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 2) 천식 발작을 유발할 수 있으므로 건성 수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거품), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타난다. 3) 피부 : 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 저각감 및 중창(부기) 등의 접촉피부염 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있다. 또한, 각질탈락(자외선에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부발진이 전신으로 확대될 수 있다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지한다. 4) 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항 1) 이 약을 사용중이거나 사용 후 2주까지는 날씨가 관계없이 목욕할 것을 피하고, 일상 외출할 때 때는 이 약의 도포(바른)부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 한다. 흰색이나 얇은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 입는다.(자외선에 의해, 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있다.) 2) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)이다. 3) 피부감염증을 드러내지 않게 할 수 있도록

감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께사용)하고 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄)에 유의한다. 4) 만성질환(퇴행성관절염(골(뼈)관절염)등에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의한다. 5) 눈 및 점막에는 사용하지 않는다. 6) 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다. 7) 무릎, 백선 등에는 사용하지 않는다. 8) 밀봉용대병을 사용하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관 [포장단위] 10매

- ※ 환부(질환부위)를 깨끗이 하고 건조상태에서 부착하십시오.
- ※ 건조후가 연약한 피부 또는 모발이 많은 부위에 부착한 경우에는 미온수로 적당히 불려서 떼어내십시오.
- ※ 사후나, 온점질 전후에는 피부 각질이 약해지고 네뎀가 손상되기 쉬우므로 본 제품 부착시 주의하십시오.
- ※ 동일 부위에 연속적으로 부착하는 것은 가급적 피하십시오.
- ※ 가려움이나는 즉시 떼어내고 환부(질환부위)를 흐르는 찬물에 담가두거나 얼음으로 냉정시켜 하여 주십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ※ 이 약을 사용함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- ※ 오용(잘못사용)을 막고 품질을 보호·유지하기 위해서 다른용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 아래에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- ※ 제품 기재사항 개정년월(2014년 10월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎1666-9979)에서 확인하실 수 있습니다.



201410

☎ 제품문의처 : 1666-9979
제품기재사항 개정년월 : 2014. 10

제조의뢰자 : 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동남구 풍서면 잔다리길 55

제 조 자 : 아이큐어주식회사
경기도 안성시 서문면 제3공단3길 13



제 조 번 호 :

10월



현대약품(주)