



디자인에드	품목명	품목번호	버전
		레보투스정 설명서	700625
규격	가로 138mm 세로 175mm / 접지 - 가로 35mm 세로 35mm		
인쇄규격			
글자포인트 7pt	전문약품, 원료약품 및 그 분량, 제품명		
글자포인트 6pt	주소, 성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색상	색		
지종 / 코팅	캠퍼스지 50g		
후가공	없음		
비고	폴리방향 - 두출		

접착면

- 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 레보드로프로피진(별규) 60mg
- 동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유), 스테아르산마그네슘(소의 우지)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨

[성 상] 흰색 원형 정제

[효능·효과] 다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

[용법·용량]
 성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.
 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음의 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 기관지 점액 분비 증가 환자
 - 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 중증의 간장애 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적 인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
 - 고령자
 - 만 2세 미만의 영아
- 이상반응
 - 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 - 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
 - 순환기계 : 심계항진
 - 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응
 - 국내 시판 후 수집된 중대한 이상사례 분석·평가 결과 확인된 이상사례는

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관
[포장단위] 30정, 100정, 300정

- * 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- * 이 약을 투여함으로써 알레르기성(발진, 발적, 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- * 오용을 막고, 품질을 보호, 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- * 사용설명서 개정연월일(2023년 03월 29일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처 ☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- * 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 ☎ 14-3330, 1644-6223)

제조사 : 현대약품주식회사
 충청남도 천안시 동남구 풍세면 진다리길 55

Under license from
Dompé farmaceutici S.p.A. Italy

현대약품 (주)
 ☎ 1666-9979
 사용설명서 개정연월일 : 2023. 03. 29

700625-230303M