

다 자 인 예 드	품 목 명	품 목 번 호	버 전
	리플린정240mg 살형서		240700
규 격	가로 138mm 세로 210mm / 접지 - 가로 35mm 세로 35mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약물 및 그 분량, 제품명		
글자포인트 7pt	주소, 상상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	DICS62(약)		
지 중 / 코 핑	칼박스지 50g		
후 가 공	없음		
비 고	코스텍스피라 필코더블에스정 240mg과 동일사항		

20mm

립박면

일반의약품  
조 제 용

**리플린**<sup>®</sup>

정 240mg

(은행엽건조엑스)

240700

한국약사회의  
신약인증  
신약인증  
신약인증

한국약사회의  
신약인증  
신약인증  
신약인증

한국약사회의 신약인증  
신약인증  
신약인증  
신약인증

**리플린**<sup>®</sup>

(은행엽건조엑스)

**정 240mg**

일반의약품  
조 제 용  
KGMP

**【일반의약품 및 그 분량】 정 중**

- 유효성분 : 은행엽 건조엑스(생규) ..... 240mg
- 첨가제(테트라보스) : 황색203호, 황색3호
- 첨가제(제동용유래성분) : 유당수화물(소의 우유)
- 기타 첨가제 : 미량(당성물포도오스, D-리나-톨, 육수수분분, 크로스카렐로오스나, 트롤, 경질유수구산, 스테아르산마그네슘, 셀룰, 헥실드나, 벡99GV03)

**【성 상】**  
녹색의 장방형 필름코팅정제

**【효능·효과】**  
심장력 저하, 기적력 감퇴, 환각증(동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

**【용법·용량】**  
은행엽건조엑스로서 1회 240 mg, 1일 1회 1정 복용한다. 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

**【사용상의 주의사항】**

**1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것**

- 1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
- 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
- 3) 임신부
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance, Lact 유당불내효소 결핍증, Lact lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

**2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것**

- 1) 항응고제에: 헤파린, 헤파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제를 병용투여할 때 복용(사용)하는 경우, 이들의 역할이 강해지는 것을 배제할 수 없다.
- 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시트르산 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 약물의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 있으며, 효능 및/또는 독력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약을 나베프린 및 알리렐과 같은 칼슘채널차단제와 병용투여할 때 복용(사용)할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 효능 수준이 더 높아질 위험이 있다. 경각제와 같은 병용투여할 때 복용(사용)할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 혈장 수준이 나타날 위험이 있다. 따라서 주의감시 및 투약량 조절을 고려해야 한다.

**3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 방사선사와 상의할 것**

- 1) 불결 상태가 있거나, 충치의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 한다.
- 2) 수유부(모유)로 아기가 영양이 부족하지 않도록
- 3) 이 약을 복용(사용)하여 뇌진동 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉시 중지하고 의사, 치과 의사, 방사선사와 상의할 것. 성당시 가능한 한 이 항부작용을 소지할 것**

- 1) 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가될 수 있으므로 잔혈을 위해 수술 전 최소 2주간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.
- 2) 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 5주 이상 지속되어야 한다. 3개월 후 증상이 호전, 재발되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 한다.

240700

**3 이상반응**

- 위장 장애 : 오심구역 등의 위장관 증상
- 신장계 : 배뇨 드물게 투동, 불면증, 환각, 출혈
- 피부 : 배양 드물게 알레르기 반응에 피부 홍반(붉은 반점, 부어오름, 가려움증), 일례로 기성 쇼크가 있을 수 있다.

장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.

4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

· 이차적

· 가려움증

5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로서 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

**5. 7년 이상의 복용(사용)시 주의할 사항**  
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에게는 투여하지 않는다.

**6. 저장상의 주의사항**

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 약품을 물에 등기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오염(감염) 사용에 따른 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

**【저장방법】** 기밀용기, 상온(15~25℃) 보관

**【포장단위】** 30장형, 300장형

**【이 약은 물과 함께 복용하십시오.】**

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움)이 나타날 경우에는 병원을 중재하고 의사 또는 의사와 상의 하십시오.
- 오심을 하고, 출혈을 보고, 위험이 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- 구입시 사용(기한)이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 이 제품의 내용에 대한 문헌은 구입처나 사용설명서에 표기된 제품문헌자료로 문의하십시오.
- 이 사용설명서 작성(2024년 07월 01일 이후 변경된 내용은 한국(주) 현대약품(주) 홈페이지(www.hyundapharm.co.kr)나 제품문헌자료(☎ 1666-6979)에서 확인 할 수 있습니다.
- 약품 부피용 신고 및 피복규제 신청 : 한국약학전문관리원 ☎ 14-3330, 1644-6226

**제조의뢰자 : 현대약품(주)**  
충청남도 천안시 동남구 동성면 천리길 55

**제조사 : 코스텍스피라**  
충청남도 천안시 마곡동리 30 일부 (모정)  
충청남도 천안시 동남구 오송읍 오송생명로 109-21 (원료공장~모정)

**◆ 제품문의처 : ☎ 1666-6979**  
**사용설명서 작성(연월일) : 2024. 07. 01**

현대약품(주)