

일반의약품

베물리[®] 플라스타

살짜크기

붙이는 벌레물림 치료제

벌레물려 가려울때

www.hyundaipharm.co.kr

42매

큐더스 커뮤니케이션즈	품목명	버전
	버물리플라스타 파우치	200603
규격	170(가로) X 130(세로)	
글자포인트 9pt	일반의약품	
글자포인트 7pt	원료약품, 성상, 효능, 사용주의사항, 저장방법 제조의뢰자, 제조자, 주소	
글자포인트 8pt	현대약품 / 대화제약	
색상	4원색 + 백색 (기존동일)	
비고	사이즈 확인바랍니다.(jpg 인쇄 참고, 디자인문의: 02 548 1976)	

<h3>일반의약품 정보</h3> <p>[유효성분] 1매 (원지름 28mm 6.157cm², 138.54mg) 중</p> <p>디펜히드라민(HCl) 0.493mg 이소프로필메틸페놀(붕규) 0.493mg L-멘톨(HCl) 1.478mg</p> <p>[효능·효과] 벌레물림제, 가려움, 동창(인 상처)</p> <p>[용법·용량] 1일 1~수회(여러 차례, 1회 1매씩 환부(질한부위)에 붙인다.</p> <p>[사용상의 주의사항]</p> <p>1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 1) 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 사람 2) 30개월 이하의 소아</p> <p>2. 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것. 1) 눈 또는 눈 주위, 점막 등 2) 습진, 욕 등에 의한 피부염, 상처 부위, 민감한 피부</p> <p>3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진, 발적(충혈)되어 붉어짐, 가려움, 욕 등에 의한 피부염 등이 나타난 적이 있는 사람 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 3) 습윤(습기 찬)이나 짓무름, 염증이 심한 환자 4) 의사의 치료를 받고 있는 사람</p> <p>4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 사용으로 인해 발진, 발적(충혈)되어 붉어짐, 종창(부기), 가려움, 통증, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우 2) 5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우</p> <p>5. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법, 용량을 지킬 것 2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용할 것 3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것 5) 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻을 것, 증상이 심한 경우에는 안과의사의 치료를 받을 것 6) 적용부위를 깨끗이 닦고, 외부의 열이나 뜨거운 물에 노출하지 말 것 7) 이 약을 사용한 부위에 물이 닿은 경우, 강한 자극을 느낄 수 있음 8) 피부가 특히 약한 환자는 동일한 부위에 이 약을 연속적으로 사용하지 말 것 9) 1회 부착 시간은 4~5시간 정도로 하여 같은 부위에 장시간 사용하지 말 것 10) 드물게 부착부위에 염증이나 색소침착 등이 발생할 수 있음 11) 환부(질한부위)가 땀 등으로 젖은 경우에는 잘 닦아낸 후 사용할 것.</p> <p>6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고</p>	<p>서늘한 곳에 보관할 것, 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 덮어 보관할 것, 4) 사용 기간이 지난 제품은 사용하지 말 것.</p> <p>[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관</p> <p>[포장단위] 42매(6매×7장)</p> <p>■ 기타 첨가제 : 부틸레이트디히드록시톨루엔, 스티렌-이소프렌-스티렌블록공중합체, 수소첨가 C6-20폴리올레핀, 우동파라핀, 폴리에스터/에틸렌비닐아세테이트 라미네이트 필름, 폴리메틸렌테트라프탈레이트 세파레이터</p> <p>[성상] 반투명한 흰색의 둥근 원모양의 첨부제</p> <p>※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. ※ 이 약을 사용함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈)되어 붉어짐, 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오. ※ 오용(잘못사용)을 막고 품질을 보호 유지하기 위해서 다른용기에 넣어 사용하지 마십시오. ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 아래에 표시된 제품문의처로 문의하십시오. ※ 제품 기재사항 개정연월일(2019년 11월 19일)이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (http://www.hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처(1666-9979)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 ☎ 1644-6223</p> <p>※ 제품문의처 : 1666-9979 제품기재사항 개정연월일 : 2019년 11월 19일</p> <p>■ 제조의뢰자 현대약품주식회사 충청남도 천안시 동남구 풍세면 전다리길 55</p> <p>■ 제조자 대화제약주식회사 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495</p> <p>200603 OTHER</p> <p>8 806420 038515</p>	<p>일반의약품 분류번호:264</p> <p>제조번호: 사용기한:</p>
---	--	--