

디자인앤드	품 목 명	품목번호	버전
	버물리에스액 설명서	701011	190701
규 격	가로 : 120mm 세로 : 150mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	DIC129, DIC582(백)		
지중 / 코팅	70g 모조지 또는 상응하는 지중		
후 가 공	없음		
비 고			

- 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

사용설명서



현대약품은 제약업계 최초로
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

벌레물려 가려울땐
버물리[®]
에스액

분류번호

264

일반의약품

KGMP

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중

■ 유효성분

디펜히드라민염산염(KP)	2g
디부카인염산염(KP)	0.3g
ℓ - 멘톨(KP)	3g
살리실산메틸(KP)	3g
dL- 캄파(KP)	3g
에녹솔론(BP)	0.2g

■ 기타 첨가제 : 농글리세린, 스킨케어81-41347, 암모니아수, 에탄올, 인산이수소칼륨, 정제수

【성 상】 특이한 향이 있는 무색 액제

【효능·효과】

습진, 피부염, 찰진, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창(언 상처)

【용법·용량】

1일 수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

30개월 이하의 유아

2. 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것.

- 1) 눈 또는 눈주위, 점막 등
- 2) 습진, 상처부위, 민감한 피부

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

특히, 벗겨진 피부 표면 또는 물집이 있는 부위에 다량을 사용하지 말 것.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등이 나타난 적이 있는 사람)
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 습윤(습기 참)이나 짓무름, 염증이 심한 사람
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 5) 소아(경련을 유발할 수 있다.)
- 6) 순환기 장애 또는 당뇨병 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우

701011-190701

2) 5 ~ 6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우

6. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.
- 3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것.
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻을 것. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 치료를 받을 것.
- 5) 사용 전에 잘 흔들어 사용할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 4) 불 근처에 두지 말 것.
- 5) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 말 것.
- 6) 시계, 안경 등의 플라스틱류, 도장이 되어있는 마루, 가구 등에 접촉 시 변질될 수 있으므로 닿지 않게 주의할 것.

【포장단위】 50mL/병

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※ 세워서 보관하세요.

※ 사용 후 뚜껑을 꼭 닫고, 용기를 세워서 보관하십시오. 눕혀서 보관할 경우 액이 흘러 내릴 수 있습니다.

※ 본 제품을 먹지 마십시오.

※ 본 제품을 눈에 바르거나 분무하지(뿌리지) 마십시오.

※ 이 약을 사용함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투어를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 개정연월일(2019년 07월 05일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (☎1644-6223)

제조사 : 현대약품주식회사

충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

☎ 제품문의처 : ☎ 1666-9979

사용설명서 개정연월일 : 2019. 07. 05

