

디자인앤드	품 목 명	품목번호	버전
	시노카엔캡슐/설명서	701417	190701
규 격	가로160mm 세로:155mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	DIC157, DIC582(백)		
지종 / 코팅	70g 모조지 또는 상응하는 지종		
후 가 공	없음		
비 고			

사용설명서

현대약품은 제2의 업계 최초로  
CCM 인증 기업으로서  
소비자 중심 경영을 실천합니다.

콧물·코막힘·재채기엔~

# 시노카엔캡슐

분류번호  
141  
일반의약품  
KGMP

- 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

콧물, 코막힘, 재채기는 급격한 기온변화, 바이러스, 알레르겐(알레르기를 일으키는 물질) 등이 원인이 되어 코점막에 염증이 생겼을 때 나타나는 급성 및 알레르기성 비염(코염)의 주 증상입니다.  
**시노카엔캡슐**은 세가지 성분이 복합된 복합제로서 항염, 항균 작용에 의해 감기에 의한 이차감염을 방지하고, 부교감 신경 차단 작용과 히스타민에 의한 모세혈관 확장을 억제하여 콧물, 눈물 등의 분비물을 감소시킵니다. 용법대로 복용하시면 코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 콧물, 재채기 등의 증상 완화에 효과적으로 사용하실 수 있습니다.

**[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중**

- 유효성분
- 벨라돈나총알카로이드(별규) ..... 0.13mg  
(하오스시아민으로서 0.1235mg)
- 클로르페니라민말레산염(KP) ..... 4mg
- 페닐레프린염산염(KP) ..... 3.33mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호
- 첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(소의 우지)
- 기타 첨가제 : 무수인산수소칼슘, 캡슐(상·담청색, 하·백색)

**[성 상]**  
백색의 분말이 든 상부는 담청색, 하부는 백색의 경질 캡슐제

**[효능 · 효과]**  
코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통(목구멍 통증), 머리무거움

**[용법 · 용량]**  
성인 : 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

**[사용상의 주의사항]**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
  - 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
  - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
  - 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.  
다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 멀미약, 알레르기용약 등)
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
  - 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기)·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기)·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.

701417-190701

- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 고혈압, 심장질환, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 눌)곤란, 갑상선질환, 당뇨병 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 고령자(노인)
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람  
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.**

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
출혈성비출중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(총혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 눌)곤란, 두통, 안면홍조(얼굴이 붉어짐), 비정상적인 눈부심
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

**5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항**

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것.

**6. 저장상의 주의사항**

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

**[포장단위] 10캡슐**

**[저장방법]** 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

- 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- 이 사용설명서 개정연월일(2019년 07월 05일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처(☎1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (☎1644-6223)

※ 오른쪽의 그림과 같이 캡슐이 들어있는 PTP시트의 손가락으로 강하게 눌러서 뒷면의 알루미늄을 터뜨려 꺼내어 드십시오.(그대로 드시면 식도 점막을 자극하여 사고로 이어질 수 있습니다.)

여기를 누르세요

제조사 : 현대약품주식회사  
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

**현대약품(주)**

☎ 제품문의처 : ☎ 1666-9979  
사용설명서 개정연월일 : 2019. 07. 05