

셀렘디자인연구소	품 목 명	품목번호	버전
	한생액 사용설명서	701438	210403
규 격	140x235mm		
바코드규격	-		
글자포인트 8pt	원료약품 및 그 분량, 성상, 효능효과 외 전체 내용		
글자포인트 9pt	원료약품 및 그 분량, 성상, 효능효과 외 타이틀 제목		
색 상	Pantone 730, CMYK		
지중 / 코팅	모조지 70g		
후가공	-		
비 고			

- \* 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- \* 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- \* 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



현대약품은 제약업계 최초  
CCM 인증 기업으로서  
소비자 중심 경영을 실천합니다.

다섯가지 생약성분이  
함유된 한방기침약

# 한생액

사용설명서

일반의약품

KGMP

**[원료약품 및 그 분량] 100mL 중**

- 유효성분 : 맥문동 30% 에탄올 유동엑스(별규) ..... 4.17mL
- 남천실 30% 에탄올 유동엑스(별규) ..... 3.125mL  
(α-메틸도메스티신으로서 2.5mg)
- 감초엑스(3→1)(별규) ..... 1,250mg  
(글리시리진산으로서 93.8mg)
- 길경 33.3% 에탄올 유동엑스(4→1)(별규) ..... 625mg
- 우황(KP) ..... 6.25mg  
(결합형 빌리루빈으로서 0.75mg)
- 구아아골설펜산칼륨(KP) ..... 375mg
- d-메틸에페드린염산염(KP) ..... 156.3mg
- 첨가제(보존제) : 파라옥사벤조산프로필 10mg
- 기타 첨가제 : 백당, 시트르산, 에탄올, 경제수, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 폴리소르베이트80, 허브향-에이, D-소르비톨액

**[성 상]** 황갈색의 특이한 생약냄새와 감미가(단맛이) 있는 내용 액제

**[효능·효과]** 기침, 가래, 천식

**[용법·용량]**

- 성인 1회 : 8mL
- 소아 1회 : 11세 이상 ~ 15세 미만 : 5mL
- 8세 이상 ~ 11세 미만 : 4mL
- 3세 이상 ~ 8세 미만 : 2mL
- 2세 이상 ~ 3세 미만 : 1.5mL

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.  
1일 3회 복용한다. 1일 6회까지 복용할 수 있고 복용 간격은 4시간 이상으로 한다.

**[사용상의 주의사항]**

**1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.**

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
- 2) 약으로 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 간장애, 신장애(신장장애), 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열 환자, 허약자
- 4) 고혈압 환자, 고령자(노인), 심장애 환자, 부종(부기) 환자
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 환자

**2. 이상반응**

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메타이마이드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

**3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.**

- 1) 이 약의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담한다.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g이상인 제제는 장기 연용(계속 복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨, 체액의 저류(체액 고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지한다.
- 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지한다.

**4. 일반적주의**

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 수회(여러 차례) 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여한다.
- 4) 장기간 계속하여 투여하지 않는다.(1일 최대배합량이 글리시리진산으로서 40mg 이상 또는 감초로서 1g 이상을 함유하는 제제)

**5. 상호작용**

다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등과 병용투여(함께 복용)하지 않는다.

**6. 소아에 대한 투여**

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

**7. 저장상의 주의사항**

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀건하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관한다.

**[저장방법]** 기밀용기, 실온 (1~30°C)보관

**[포장단위]** 75mL/병, 8mL/포 x 10포, 8mL/포 x 6포

- ※ 냉동이나 가열하지 마십시오. 병이 파손되어 다칠 수 있습니다. (75mL / 병)
- ※ 동봉된 계량컵을 사용하여 복용하십시오. (75mL / 병)
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
- ※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환 하여 드립니다.
- ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- ※ 이 사용설명서 개정연월일(2021년 04월 05일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (☎ 14-3330, 1644-6223)

제품문의처 : ☎ 1666-9979  
사용설명서 개정연월일 : 2021.04.05

제조회사 : 현대약품(주)  
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

제조사 : (주)제뉴원사이언스  
세종특별자치시 전의면 산단길 245

**사용법 (75mL/병)**

- 1) 뚜껑 윗부분을 누른 상태에서
- 2) 시계 반대방향으로 돌려주세요.

