



현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

세균성 피부질환 치료제

메타로신 연고

(무피로신)

사용설명서

일반의약품

KGMP

- ※ 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- ※ 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

■ 유효성분

- 무피로신(KP)-----20mg(역가)
- 기타 첨가제 : 백색바셀린, 유동파라핀, 폴리소르베이트 60

[성상] 백색의 연고제

[효능·효과]

1. 유효균종 : 메치실린 내성균주를 포함한 황색포도상구균, 기타 포도상구균(포도알균), 연쇄상구균과 같은 대부분 피부감염증의 원인균, 대장균 및 인플루엔자균과 같은 그람음성균효성분
2. 적응증
 - 1) 농가진(고름 딱지증), 모낭염, 종기증(부스럼), 감염성 습진과 같은 세균성 피부 감염증
 - 2) 외상(상처) 및 화상에서의 세균성 피부 감염증

[용법·용량]

감염부위를 1일 2~3회 10일간 소량을 바른다. 필요한 경우 바른 부위를 드레싱하거나 밀봉할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 또는 이 약의 성분이나 폴리에틸렌글리콜을 함유하는 다른 연고제에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 신질환 환자(폴리에틸렌글리콜이 찢긴 상처 및 손상된 피부를 통해 흡수될 수 있으며, 신장(콩팥)을 통해 배설된다.)
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 4) 수유부

2. 다음환자에는 신중히 투여할 것

노출되어 찢긴 상처 및 손상된 피부에 장기간 사용하지 않는다(동물실험에서 면역기능 저하에 관한 안전성 증거가 불충분하다).

3. 이상반응

- 1) 무피로신 또는 연고기제로 인하여 작열감(화끈감), 자통(찌르는 것 같은 아픔) 또는 동통(통증), 가려움, 발진, 홍반(붉은반점)등의 피부 과민반응이 나타날 수 있다.
- 2) 때때로 구역, 피부건조, 압통(누르는 통증), 부종(부기), 접촉성 피부염, 삼출물 증가가 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 전신(온몸)적인 알레르기 반응이 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약으로 인한 과민증 또는 중증(심한중상)의 국소자극, 가려움, 발진 등이 나타날 경우에는 사용을 중지하고, 피부에서 연고를 깨끗이 씻어낸 후, 의사 또는 약사와 상의하여 감염치료를 위한 다른 방법을 선택한다.
- 2) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현(드래뎀)등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 사용한다.
- 3) 다른 항생물질과 같이 이 약을 장기 연용(계속사용)하는 경우에는 진균(곰팡이) 등을 포함하여 미생물의 과다증식을 유발할 수 있다.
- 4) 3~5일간 사용 후 개선효과가 나타나지 않으면, 의사 또는 약사와 상의하여 이 약의 사용을 다시 고려한다.
- 5) 이 약을 얼굴에 사용하는 경우에는 눈에 들어가지 않도록 주의한다.
- 6) 운전이나 기계조작능력과 관련된 이상반응은 확인된 바 없다.

5. 상호작용

이 약과 다른 여러 약물을 동시에 사용할 경우, 희석(묽게 함)되어 항균작용이 감소되고 이 약의 안전성이 소실될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부에서의 이 약의 사용과 관련된 적절한 자료가 없다. 동물실험에서 초기형성(기형 유발성)은 나타나지 않았으나, 동물실험 결과로 인체내에서의 반응을 예측할 수는 없으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 이 약을 사용하지 않는다.
- 2) 수유 중인 사람과 동물에서의 이 약의 사용과 관련된 적절한 자료가 없다. 유즙으로의 이행여부는 알려져 있지 않으므로 이 약의 투여 중에는 수유를 중단한다.

7. 과량투여시의 처치

이 약의 독성은 매우 낮다. 과량 투여한 경우에는 해당 부위를 깨끗이 씻는 등 대증요법(증상별로 치료 하는 방법)을 실시한다.

8. 적응상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로부터 사용한다.
- 2) 이 약은 눈, 코 등의 점막 표면에 사용하지 않는다. 비강(코안)내에 사용시 자통(찌르는 것 같은 아픔) 및 건조의 발생이 보고되었다.
- 3) 이 약은 중앙정맥 삽관법을 시행할 부위에 사용하기에는 적합하지 않다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것
- 3) 치료 후 남은 약은 폐기할 것

[포장단위] 10g/튜브

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서는 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 작성연월일(2024년 2월 00일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

※ 약약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎ 14-3330, 1644-6223)

제조의뢰자 : 현대약품(주)

충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

제품문의처 : ☎ 1666-9979

충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

제조사 : 태극제약(주)

충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

