

설렘디자인연구소	품 목 명	품목번호	버전
	풋원겔 / 사용설명서		210401
규 격	150x224mm		
바코드 규격	-		
글자포인트 7pt	기재사항, 원료약품 및 그 분량, 성상, 효능효과, 용법용량, 사용상의 주의사항, 포장단위, 저장방법		
글자포인트 7pt	제조의뢰자, 제조자, 제품문의처 외 전체		
색 상	Pantone 287 -		
지종 / 코팅	모조지 70g 또는 그와 상응하는 지종		
후가공	-		
비 고	-		

※ 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
 ※ 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
 ※ 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



복합성분으로 효과빠른 젤타입 무좀치료제
풋원겔 FOOT-ONE GEL
무좀 완선 백선
(사타구니백선)

사용설명서
일반의약품
KGMP

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

- 유효성분: 테르비나핀염산염(JP) 10mg
리도카인(KP) 20mg
에녹솔론(EP) 1mg
디펜히드라민염산염(KP) 10mg
이소프로필메틸페놀(별규) 10mg

■ 기타 첨가제: 디이소프로판올아민, 에탄올, 정제수, 체리블라섬 HP-AE38101, 카보마940, 폴리옥실40·경화피마자유, 프로필렌글리콜

[성상] 무색 투명한 젤제

[효능·효과] 무좀, 완선(사타구니백선), 백선

[용법·용량] 1일 1회 적량을 환부(질환 부위)에 도포한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

- 1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 부적, 가려움, 봇기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유·소아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것

- 1) 눈과 눈 주위, 점막(예를 들어 입안, 코안, 질 등), 음부, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습기침, 짓무름, 갈라짐 또는 상처가 심한 질환부위
- 4) 손톱, 두피

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질의 사람
- 4) 질환부위가 얼굴에 있거나 광범위한 사람
- 5) 질환부위가 깊은 사람
- 6) 「습진과「무좀·완선(사타구니백선), 체부백선」의 구분이 불확실한 사람(음부가려움, 짓무름 등의 증상이 있는 경우에는 습진 등 다른 원인에 의한 경우가 많다)

7) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 침부문서를 소지할 것.

- 1) 피부: 염증, 낙설(비듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 상처, 피부건조 및 피부가 달지는 느낌, 피부의 갈리짐, 통증, 색소 침착, 자극감, 열감, 인비늘, 짓무름, 수포, 발진 발적(충혈되어 붉어짐)* 가려움증*, 봇기* 두드러기*

* : 전신에 발현(드러남) 할 수도 있습니다.

2) 2주정도 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 또는 이 약의 사용에 의해 증상이 악화된 경우

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 경해진 용법 용량을 준수할 것
- 2) 질환 부위와 그 주위를 깨끗이 한 후 사용할 것
- 3) 눈에 들어가지 않도록 주의. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 온수로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받을 것
- 4) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 말 것

210401

5) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것

6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
- 2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것
- 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말 것. 그리고 사용기한 내에서도 개봉 후는 품질유지를 위해 최대한 빨리 사용할 것
- 5) 합성수지스티커 등을 연화시키거나, 도료를 녹이거나 하는 경우가 있으면, 비단이나 가구 등에 묻지 않도록 할 것
- 6) 화기나 가깝게 두거나 불속에 넣거나 하지 말 것. 또한 사용이 끝난 용기는 불속에 던지지 말 것

[포장단위] 15g

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

※ 사용전에 잘 훤파여 주십시오.

※ 개봉 후에는 뚜껑을 꼭 닫아 보관하여 주십시오.

※ 뚜껑이 열린 상태에서는 내용물이 흘러나올 수 있습니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 사용함으로써 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 개정연월일(2021년 02월 26일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처 (☎ 1666-9979)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원 (☎ 14-3330, 1644-6223)

[제조의뢰자] 현대약품(주)

충청남도 천안시 동남구 풍세면 진다리길 55

[제조자] (주)제뉴원사이언스

세종특별자치시 전의면 산단길 245

◆ 제품문의처 : 1666-9979

사용설명서 개정연월일 : 2021.02.26

