


드 로 잉	품 목 명	품목번호	버전
	현대아라미정 / 설명서		240300
규 격	140mm x 200mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명, 성상, 효능/효과, 용법용량, 저장방법		
글자포인트 7pt	주의사항		
색 상	K		
지 중 / 코팅	70모조		
후 가 공			
비 고			

140 × 200



현대약품은 제약업계 최초  
CCM 인증 기업으로서  
소비자 중심 경영을 실천합니다.

## 손·발저림 및 혈행장애 개선제

# 현대아라미정™

사용설명서  
일반의약품  
KGMP

• 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.  
• 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.  
• 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

**[원료약품 및 그 분량] 1정 중**

- 유효성분
  - 산화마그네슘(KP) ..... 414.53mg
  - (마그네슘으로서 250mg)
  - 리보플라빈(KP) ..... 20mg
  - 메코발라민(KP) ..... 1000µg
  - 셀레늄함유 건조효모(KP) ..... 50mg
  - (셀레늄으로서 27µg)
  - 피리독신염산염(KP) ..... 20mg
  - 토코페롤아세테이트 2배산(KP) ..... 200mg
  - (비타민E로서 100IU)
  - 감마-오리자놀(KP) ..... 5mg
- 기타 첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 탭실드갈색(20B1093), 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

**[성 성] 갈색의 정방형 필름코팅정**

**[효능·효과]**

- 다음 경우의 비타민(E, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>)의 보급
  - 육체피로
  - 임신, 수유기
  - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
  - 노년기
  - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
    - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
    - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

**[용법·용량]** 만 15세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

**[사용상의 주의사항]**

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
  - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
  - 만 12개월 미만의 젖먹이
  - 심한 증상의 신부전 환자
  - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
  - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
  - 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
  - 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
  - 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
  - 심장·순환기계 기능 장애 환자
  - 신장(콩팥)장애 환자
  - 저단백혈증 환자
  - 임부

240300

8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 웨장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전혈관 막힘증의 위험이 증가될 수 있다.
- 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B<sub>6</sub>를 1일 10µg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부정(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 우발적으로 과량 복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. **일반적 주의**

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.

환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. **기타 이 약의 복용 시 주의사항**

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. **저장상의 주의사항**


- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

**[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1 ~ 30℃) 보관

**[포장단위]** 60정/병, 120정/병(60정/병X2)

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.  
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.  
※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.  
※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.  
※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.  
※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.  
※ 이 사용설명서 작성연월일(2024년 03월 07일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.  
※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원☎ 1644-6223, 14-3330)

**제조사 : 메디스제약(주)**  
 전북특별자치도 완주군 봉동읍 원주산단6로 170  
**제품문의처 : ☎ 1666-9979**  
 사용설명서 작성연월일 : 2024. 03. 07  
**제조외뢰자 : 현대약품(주)**  
 충청남도 천안시 동남구 풍세면 전대리길 55



현대약품(주)