



보건의료부 인증
혁신형 제약기업
KOREA INNOVATIVE PHARMACEUTICAL COMPANY

HYUNDAI PHARM PRODUCT LIST

국민보건에 이바지하는 현대약품 —————
인류건강에 기여하기 위한 건강한 기업정신을 지향합니다.



Product list

제 품 명	성분명/함량	적 응 증	용법 · 용량	보험청구코드	포장단위
● 순환기관용약					
씨스코 E,R 10mg/20mg	 10mg 내피 정/미세화니솔딘(별규)2.0mg 외피 정/미세화니솔딘(별규)8.0mg 20mg 내피 정/미세화니솔딘(별규)4.0mg 외피 정/미세화니솔딘(별규)16.0mg	고혈압, 협심증	1일 1회 10mg~40mg 투여, 매일아침 공복시 복용 권장	642000670 642000680	30T/100T
엘로톤 서방캡슐 50mg	 이소소르비드 5 모노니트레이트 50mg	관상동맥질환(협심증, 심근경색 등), 울혈성심부전의 보조요법 (강심배당체 또는 이뇨제와 병용)	1일 1회 50mg~100mg 투여, 아침 복용 권장	642000860	30C/100C
엘로톤 정 20mg	 이소소르비드 5 모노니트레이트 20mg	관상동맥질환(협심증, 심근경색 등), 울혈성심부전의 보조요법 (강심배당체 또는 이뇨제와 병용)	20mg씩 2회, 또는 1일 40mg 1회 경구투여	642000870	30T/300T
엘로톤 정 40mg	 이소소르비드 5 모노니트레이트 40mg	관상동맥질환(협심증, 심근경색 등), 울혈성심부전의 보조요법 (강심배당체 또는 이뇨제와 병용)	20mg씩 2회, 또는 1일 40mg 1회 경구투여	642000880	30T/100T
미녹시딜 정	 미녹시딜 5mg	증후성 및 기관손상으로 이뇨제 및 다른 고혈압 치료제에 반응하지 않는 중증 고혈압	OD 최대 40mg	642001290	30T/100T
노바스탄 하이주	 아가트로반 10mg	1. 다음 질환에 의한 신경증상, 일상생활동작의 개선: 발병후 48시간 이내의 뇌혈전증 급성기 2. 만성동맥 폐색증에서의 사지괴양, 안정시 동통 및 냉감의 개선	뇌혈전증급성기의 경우 통상 7일동안 22앰플을 지속 정적정주한다	642001640	10앰플/box
바로스크 정 5mg	 1정 중 암로디핀 베실레이트 5mg	고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형 협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축(이형 협심증)에 의한 심근성 허혈증	1일1회 5~10mg	642000380	30T/PTP, 100T/병
바로스크 정 10mg	 1정 중 암로디핀 베실레이트 10mg	고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형 협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축(이형 협심증)에 의한 심근성 허혈증	1일1회 5~10mg	642002570	30T/병
제스트릴 정	 염산리시노프릴 10.9mg (리시노프릴 무수물로서 10mg)	고혈압, 울혈성심부전, 이뇨제 또는 디기탈리스투여시 보조치료제/당뇨병성 신증	고혈압 : 1일1회 80mg 울혈성심부전 : 1일2.5~20mg 당뇨병성신증 : 1일10mg	642001330	30T/100T
테노레틱 정	 아테놀올 50mg 클로르탈리돈 12.5mg	고혈압	1일 1회 1정	642001340	30T/100T
테놀민 정 25mg	 아테놀올 25mg	고혈압, 협심증	고혈압 : 1일50mg~100mg 협심증 : 1일100mg	642001350	100T/PTP 500T/병
테놀민 정 50mg	 아테놀올 50mg	고혈압, 협심증	고혈압 : 1일50mg~100mg 협심증 : 1일100mg	642001360	100T/PTP 500T/병
듀오스크 5mg/10mg	 암로디핀 베실레이트 5mg 아토르바스타틴 10mg	고혈압, 협심증, 고지혈증	암로디핀 1일 1회 5~10mg 아토르바스타틴 1일 1회 10~80mg	642001620	30T/병
자이렙	 플루바스타틴나트륨 40mg	고콜레스테롤 혈증	1일 1회 40mg 저녁시간 복용	668100360	28C
자이렙XL	 플루바스타틴나트륨 80mg	고콜레스테롤 혈증	1일 1회 80mg 하루 중 아무 때나 매일 일정시간에 식사와 관계 없이 복용	668100340	28T
타렉	 발사르탄 80mg 발사르탄 160mg	본태성 고혈압, 심부전, 심근경색 후 사망 위험성 감소	1일1회 80mg, 최대 320mg 식사중 또는 식간	668100440 668100420	98T/PTP
코타렉	 발사르탄 +히드로클로로티아지드 80/12.5mg 발사르탄 +히드로클로로티아지드 160/12.5mg	단일요법으로 혈압이 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정, 2~4주후 최대효과 나타남	668100410 668100400	98T/PTP
네비민 정	 네비보롤 5mg	본태성고혈압, 만성심부전	고혈압 : 1일 1회 5mg 만성심부전 : 70세 이상자 1일 1회 1.25mg~10mg	642002950	30T/100T

HYUNDAI PHARM

제 품 명	성분명/함량	적 응 증	용법 · 용량	보험청구코드	포장단위
-------	--------	-------	---------	--------	------

●호흡기용약

레보투스 시럽		100ml 중 레보드로프로피진 600mg	기침: 급만성 기관지염	성인 : 1회 약 10ml, 1일 3회 소아 : 10~20kg -1회 약 3ml, 1일 3회 20~30kg -1회 약 5ml, 1일 3회	642000190	500ml, 10mlX100포
레보투스 정		1정 중 레보드로프로피진(별규) 60mg	기침: 급만성 기관지염	성인 1회 1정, 1일 3회	642002540	30T/ 100T
설포라제 캡슐		아세브로필린 100mg	기도폐쇄성장애 및 점액분비 장애로 인한 급만성 호흡기질환: 급만성 기관지염, 기관지 천식, 부비강염, 건선비염	성인 1회 1캡슐, 1일 2회	642000540	30C/ 300C
소아용 코판 시럽		100ml 중 염산클렌부테롤 0.1mg	다음 질환의 기도폐쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등 여러증상의 완화: 기관지천식, 만성기관지염, 폐기종	1일 2회 12시간 간격으로 투여 (1회용량 : Kg당 0.5ml)	642000560	1,000ml
알레기살 드라이 시럽		100g 중 페미로라스트칼륨(별규) 500mg	기관지천식, 다년성 알레르기성 비염	기관지천식 : 1일2회 투여 (1회용량 : Kg당 0.04g) 알레르기성비염 : 1일2회 투여 (1회용량 : Kg당 0.02g)	653300270	100g
알레기살 정 10mg		1정 중 페미로라스트칼륨(별규) 10mg	기관지천식, 다년성 알레르기성 비염	1일 2회 아침식사 후 및 저녁식사 후(또는 취침전)	653300290	100T/ 500T
알레기살 정 5mg		1정 중 페미로라스트칼륨(별규) 5mg	기관지천식, 다년성 알레르기성 비염	1일 2회 아침식사후 및 저녁식사 후(또는 취침전)	653300280	100T/ 500T
리나치을 시럽 2%		100ml 중 L-카르보시스테인(약전) 2g, 파라옥시안식향산메틸(약전) 0.1g	1. 다음 질환에서의 객담배출곤란: 급, 만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염, 비인두염 2. 만성부비강염, 삼출성 및 장액성중이염	6~12세 : 1회 250mg(12.5ml) TID 2~5세 : 1일 250~500mg (12.5~25ml) 4회 분할투여	642000210	1,000ml
리나치을 시럽 5%		100ml 중 L-카르보시스테인(약전) 5g, 파라옥시안식향산메틸(약전) 0.05g, 데히드로초산나트륨(식첨) 0.1g		성인 : 1회 15ml, TID 경구투여 후 중상이 호전되면 1회 10ml 소아 : 6~12세-1회 5ml TID 2~5세-1일 5~10ml 4회 분할투여	642000220	1,000ml
리나치을 캡슐 150mg		1캡슐 중 L-카르보시스테인(약전) 150mg		6~12세 : 1회 150~300mg TID 2~5세 : 1일 250~500mg 4회 분할투여	642000240	1,000C
리나치을 캡슐 375mg		1캡슐 중 L-카르보시스테인(약전) 375mg	1. 다음 질환에서의 객담배출 곤란: 급 · 만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염, 비인두염 2. 만성부비강염, 삼출성 및 장액성중이염	성인 : 1회 750mg(2캡슐) 1일 3회 경구투여, 중상이 호전되면 1회 375mg(1캡슐) 1일 4회 투여	642000250	60C/ 500C
리나치을 캡슐 500mg		1캡슐 중 L-카르보시스테인(약전) 500mg		성인 : 1회 500mg(캡슐) 1일 3회 경구투여	642000260	30C/ 500C
펠투스 시럽		펠라고니움시도이드스 11% 에탄올 추출액	급성기관지염	성인 및 12세 이상: 1회 6~9mL, 1일 3회 · 6세 이상~12세 미만: 1회 3~6mL, 1일 3회 · 1세 이상~6세 미만: 1회 1.5~3mL, 1일 3회	642002980	500ml, 9ml(포)

●항균제, 항바이러스제

조스팜 정		팜시클로버(별규) 250밀리그램	1. 대상포진 바이러스 감염증 2. 생식기포진 감염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제	대상포진 : TID 7일 생식기포진 : TID 5일 재발성 생식기포진 억제 : BID 투여	642001030	21T/병
아데팍트		아데포비어디피복실 10mg	만성 B형 간염	성인 1일 1회, 10mg을 투여한다.	642002690	30T

Product list

제 품 명	성분명/함량	적 응 증	용법 · 용량	보험청구코드	포장단위
● 중추신경계용약					
라모진 정	 라모트리진 100mg	1. 국소발작 및 전신간성 간대성 발작의 치료 2. 양극성 장애 (I형 환자에서의 우울증의 재발 예방)	2주간 50mg, 다음 2주간 100mg을 2회 분할, 유지 용량으로 1일 200~400mg을 2회 분할/발프로에이트 투여환자는 상기용량의 1/2	658600170	30T/100T
빅손 정 1mg	 로플라제페이트 1mg	1. 신경증에서의 불안, 긴장, 우울, 수면장애 2. 정신신체장애(위십이지장궤양, 만성위염, 과민성대장증후군, 자율신경실조증)에서의 불안, 수면, 장애, 긴장, 우울	1일 1~3mg을 1~2회 분할 경구투여	642000510	30T/100T
빅손 정 2mg	 로플라제페이트 2mg	1. 신경증에서의 불안, 긴장, 우울, 수면장애 2. 정신신체장애(위십이지장궤양, 만성위염, 과민성대장증후군, 자율신경실조증)에서의 불안, 수면, 장애, 긴장, 우울	1일 1~3mg을 1~2회 분할 경구투여	642000520	30T/100T
팍세틸 정	 파록세틴 20mg	불안을 수반하는 우울증을 포함하여 모든 형태의 우울성 질환의 치료 및 재발 억제, 강박장애의 치료 및 재발 억제, 공황장애의 치료 및 재발 억제, 범불안 장애(GAD)의 치료 및 재발 억제, 외상후 스트레스장애(PTSD)의 치료, 사회불안장애/사회 공포증의 치료	1일 1회 20mg투여 최대 50mg 증량	642001180	30T/100T
팍세틸 CR정	 파록세틴 12.5mg	1. 주요 우울증의 치료 2. 광장공포증을 수반하거나 하지 않는 공황장애의 치료 3. 사회불안 장애, 사회 공포증의 치료 4. 월경 전 불쾌 장애의 치료	1일 1회 25mg 투여 최대 62.5mg 증량	642001170	30T/100T
멀타핀 정 7.5mg	 미르타자핀 7.5mg			642003110	30T
멀타핀 정 15mg	 미르타자핀 15mg	주요 우울증의 치료	1일 15mg(1정)으로 시작, 임상효과가 나타날때 까지 용량증가	642003090	30T
멀타핀 정 30mg	 미르타자핀 30mg			642003100	30T
엑스프라 정	 에스시탈로프라 10mg	주요우울장애, 광장공포증을 수반하거나 수반하지 않는 공황장애, 사회불안장애(사회공포증), 범불안장애, 강박장애의 치료	1일 1회 10mg 투여, 최대 20mg 증량	642001670	30T/100T
타미린 서방정 8mg	 갈란타민 8mg		초기요법 : 1일 1회 8mg(4주)	642001920	30T/100T
타미린 서방정 16mg	 갈란타민 16mg	알츠하이머 형태의 경동도, 중등도 치매 증상의 치료	유지요법 : 1일 1회 16mg, 24mg까지 증량 가능	642001930	30T/100T
타미린 서방정 24mg	 갈란타민 24mg			642001120	30T/100T
하이페질정 5mg	 도네페질 5mg	알츠하이머치매, 혈관성치매	1일 1회 5mg 취침 전, 10mg 까지 증량 가능	642002760	30T
하이페질정 10mg	 도네페질 10mg			642002750	30T
올라핀정 2.5mg	 올란자핀 2.5mg			642002550	28T
올라핀정 5mg	 올란자핀 5mg	정신분열병 양극성장애에서 조증	1. 정신분열병 : 1일 1회 10mg 2. 조증 : 1일 1회 15mg 1일 1회 10mg (병용요법시)	642002510	28T
올라핀정 10mg	 올란자핀 10mg			642002520	28T
스타레탐정 250mg	 레비티라세탐 250mg	처음 간질로 진단된 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(16세 이상) 기존 1차 간질치료제 투여로 적절하게 조절이 되지 않는 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(4세 이상) - 소아 간대성 근경련 간질(Juvenile Myoclonic Epilepsy)환자의 근간대성 발작의 치료(12세 이상) - 특발성 전신성 간질(Cryptogenic Generalized Epilepsy) 환자의 1차성 전신 강직-긴대 발작의 치료 (12세 이상)	식사와 관계없이 투여, 충분한 양의 물과 함께 복용 1일 용량은 1일 2회 균등한 용량으로 나누어 투여한다.	642003140	30T/120T
스타레탐정 500mg	 레비티라세탐 500mg			642003150	30T/120T
스타레탐정 1000mg	 레비티라세탐 1000mg			642003160	30T/120T

HYUNDAI PHARM

제 품 명	성분명/함량	적 응 증	용법 · 용량	보험청구코드	포장단위
-------	--------	-------	---------	--------	------

●내분비용약

다이엑트 정		염산피오글리타존 16.53mg	제 2형(인슐린 비의존형) 당뇨병 환자	1일 1회 15~30mg 경구투여	642000120 30T
글리메린 정		:경구용 혈당강화제를 식이요법, 운동요법과 1정 중 글리메피리드(별규) 2mg	인슐린-비의존형(type II) 당뇨병 :식이요법, 운동요법, 체중감량만으로 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우 단독으로 투여 병행하여 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우 인슐린과 병용하여 투여 :실포닐우레아제 또는 메트포르민을 식이요법, 운동요법과 병행하여 혈당조절이 적절하게 이루어지지 않는 경우 메트포르민과 병용하여 투여	초기 1일 1mg부터 식전투여, 1~2주간격으로 1mg씩 증가	642000020 30T/100T
다이시드 서방정		1정 중 치옥트산(KPC) 600mg	당뇨병성 다발성 신경염의 완화	1일 1회 600mg, 아침식전 30분 투여	642000110 30T/100T

●피임제

엘라원		1정 중 울리프리스탈아세테이트(별규) 30mg	무방비한 성교 또는 피임방법의 실패로 인한 경우, 성교후 120시간(5일) 이내에 즉시 사용하는 응급피임약	1회 1정을 복용.	비급여 1T
노레보원		1정 중 레보노르게스트렐 (EP) 1.5mg	무방비한 성교 또는 피임방법의 실패로 인한 경우, 성교후 72시간 이내에 즉시 사용하는 응급피임약	1회 1정을 복용.	비급여 1T

●호르몬요법제

디비나 정 21T		길초산에스트라디올 2mg 초산메드록시프로게스테론 10mg	에스트로겐 결핍으로 인한 폐경기 증후군, 무월경, 희발월경 등의 성호르몬대체요법	1일 1정씩 21일간 복용한 후 7일간 휴약	642000150 21정 (백색정 11정, 담청색정 10정)
인디비나 정 1mg/2.5mg					642000960
인디비나 정 1mg/5mg		길초산에스트라디올, 초산메드록시프로게스테론	에스트로겐 결핍증상의 호르몬 대체요법 골다공증의 예방	동일한 시간에 규칙적으로 1일 1회 1정씩 중단없이 복용한다	642000970 28T
인디비나 정 2mg/5mg					642000980

●안과용제

하이파릴 점안액		니프라딜 2.5mg (식품의약품안전청고시 제1998-127호)	녹내장, 고안압증	성인 1일 2회 , 1회 1 drop	642001380 5mL/병 ×10개
라타신 점안액		오플록사신(USP) 3mg	<적응증> 안검염, 누낭염, 맥락염, 결막염, 검판선염, 각막염 (각막궤양을 포함), 안과 수술 전후의 무균화 요법	·1회 1방울 1일 3회 점안(도포한다). ·증상에 따라 적절히 증감한다.	642002970 5mL ×1개
로마탄 점안액		라타노프로스트 (별규) 0.05mg 첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물액10% 2.00mg (벤질코늄염화물로서 0.2mg)	다음 질환의 안압하강 : 개방각 녹내장, 만성폐쇄각 녹내장, 고안압증	질환이 있는 눈에 하루 1회 방울을 점안한다. 이 약은 저녁에 투여했을 때 안압강하의 최적 효과를 얻을 수 있다. 이 약은 하루 1회 이상 투여해서는 안된다. 투여횟수를 늘리면 안압강 화 효과가 감소하는 것으로 나타났다.	642002960 2.5mL ×1개

●탈모치료제

미노페시아 정		1정 중 피나스테리드 1mg	성인남성(만18~41세)의 남성형 탈모(androgenetic alopecia) 치료	OD	비급여 28T
---------	---	--------------------	--	----	---------

●아비인후과용약

살라겐 정		염산필로카르핀 5mg	두부암 또는 경부암에 대한 방사선요법에 의해 일어난 타액선의 기능저하로 인한 구강건조증의 치료 쇼그렌증후군 환자의 구강 건조증 또는 안구건조증 치료	두부암 또는 경부암 환자 : T1D (최소 12주 유지요법) 쇼그렌증후군환자 : QID	642000530 30T/ 100T/병
-------	---	-------------	---	--	--------------------------

Product list

제 품 명		성분명/함량		적 응 증		용법 · 용량		보험청구코드		포장단위	
● 소화기관용약											
바루나 에스 정			디히드록시알루미늄탄산나트륨 300mg 디메치론 30mg	위산과다 및 다음 증상의 보조치료 : 급만성위염, 십이지장궤양, 위통, 속쓰림, 위부팽만감, 위부불쾌감		1회 2정, 1일 3회, 식간 및 취침전에 씹어서 복용		비급여		1,000T	
현대아크라톤 캡슐 50mg			나파디실산 아클라토늄 50mg	다음 경우에서의 소화기 기능 이상 (구역, 구토, 식욕부진, 복부팽만감) : 만성위염, 담도이상운동증, 소화관 수술후		1회 1캡슐, 1일 3회 복용		642001320		30C/300C	
속시틴			Mosapride citrate 5mg	위장운동조절 및 진경제		1일 15mg 3회 식전 또는 식후에 경구 투여		642001250		30T/100T	
가란타제 산			아스퍼길루스 갈락토시다제 5,000 ONPG	1. 유아의 유당불내에 의한 소화불량개선: 1차성 및 2차성 유당 불내증(단일증후성설사, 급성소화불량, 감기성설사, 만성 설사, 미숙아 및 신생아의 설사) 2. 경관영양식, 경구유동식 등 섭취시 유당 불내에 의한 설사		1회 0.25g~0.5g을 수유 중 투여		642000010		60g(Bottle)	
● 마약성 진통제											
액틱 구강 정			200mcg: 1정 중 구연산펜타닐 0.3142mg(펜타닐로서 0.2mg) 400mcg: 1정 중 구연산펜타닐 0.6284mg(펜타닐로서 0.4mg) 600mcg: 1정 중 구연산펜타닐 0.9426mg(펜타닐로서 0.6mg) 800mcg: 1정 중 구연산펜타닐 1.2568mg(펜타닐로서 0.8mg)	성인, 현재 지속성 통증에 대한 아편양 대체 약물 치료를 받고 있으며, 이에 대한 내약성을 가진 암 환자의 돌발성 통증		암환자의 돌발성 통증 시 1회 1정, 1일 4정 이하		642000770 642000780 642000790 642000800		30T	
● 골다공증 치료제											
드로본 정			1정 중 이반드론산 나트륨일수화물 168.75mg	폐경 후 여성의 골다공증 치료		월 1회 1정을 정기적으로 매일 같은 날 아침에 음식물, 음료수(물 제외) 또는 다른 경구 약물이나 식품 보조제 (칼슘 포함) 등을 섭취하기 최소 1시간 전에 충분한 양의 물과 함께 복용		642000900		1T	
● 진통소염제											
펜큐어 정		 	펜큐어 정: 1정 중 염산트라마돌 37.5mg+아세트아미노펜 325mg 펜큐어세미 정: 1정 중 염산트라마돌 18.75mg+아세트아미노펜 162.5mg	중등도, 중증의 급만성 통증		초하용량 2정, 6시간 간격 투여, 하루 최대 8정		642001080 642001070		30T/100T	
제포 정 4mg			1정 중 로록시캅(별규) 4mg	류마티스성 관절염, 골관절염/ 요통, 발치후 동통		통상 성인의 경우 1회 1정 1일 2~3회 복용		642001000		30T/100T	
제포 정 8mg			1정 중 로록시캅(별규) 8mg	류마티스성 관절염, 골관절염/ 요통, 발치후 동통		통상 성인의 경우 1회 1정 1일 2회 복용		642001010		30T/100T	
● 비뇨생식기관용약											
유레민 정 0.1mg			초산데스모프레신 0.1mg (데스모프레신으로서 0.089mg)	1. 일차성 당뇨병(5세 이상) 2. 아간디뇨와 관련이 있는 아간디뇨증상의 치료 (성인에 한함)		취침전 OD		642000930		30T	
유레민 정 0.2mg			초산데스모프레신 0.2mg (데스모프레신으로서 0.178mg)	1. 일차성 당뇨병(5세 이상) 2. 아간디뇨와 관련이 있는 아간디뇨증상의 치료 (성인에 한함)		취침전 OD		642000940		30T	
지노프로 질정			락토바실루스 아시도필루스균의 동결건조물 50mg/에스트라올 0.03mg 유당 600mg	소독제나 항생제로 국소 또는 전신치료후 데데를라인 균총의 정상화, 폐경기와 노년기의 질세균총의 정상화, 질분비 혼합균총에 의한 질감염, 칸디다성 질감염, 가드넬렐라균에 의한 질감염		1일 1회, 1~2정을 취침전에 삽입		642001040		6T	
유로큐 서방정			엘주석산톨로르딘 4mg	절박뇨, 빈뇨 또는 절박성 요실금과 같은 증상의 과활동성방광의 치료		OD		642000950		30T	

HYUNDAI PHARM

제 품 명	성분명/함량	적 응 증	용법 · 용량	보험청구코드	포장단위
● 외 피 용 제					
알크로반 크림 0.1%	 디프로피온산 알클로메타손 (유.에스.피) 1mg 파라옥시안식향산메칠(약전) 2mg	습진, 피부염군(진행성지장각피증 포함), 건선, 양진균(구진두드러기를 포함), 발레쿨린데, 손, 발바닥 농포증, 편평태선, 장미색비강진, 홍피증, 홍반증(다형침출성홍반, 모낭각화증), 약진, 중독진, 진행성색소성자반성피부병, 만성원판상홍반성루푸스	1일 1~2회	642000760	10g
엑스엘-안 겔	 1g 중 폴루오시노나이드 0.5mg	1. 주효능효과: 알레르기성피부염, 접촉성피부염, 습진양피부염, 화폐상피부염, 유아피부염, 급만성피부염, 신경성피부염, 아토피성피부염, 원형홍반성양창 2. 다음 질환에도 사용할 수 있다. 지루성피부염, 음부 및 항문소양증, 건선, 동창, 구진성두드러기, 곤충자상, 자기감작피부염, 원형탈모증, 약진, 방사선피부염, 한포진, 양진	1일 3~4회	642000850	10g
● 지 혈 제					
타코콤 2.5x3.0x0.5cm	 단위면적(1cm ²) 중 콜라겐(스폰지)(별규) 1.3~2.0mg 피브리노겐(별규) 4.3~6.7mg 트롬빈(별규) 1.5~2.5 IU 아프로타닌(EF) 0.055~0.087 E.P.U	1. 기존 치료법으로 조절할 수 없는 경우 또는 기존 치료법으로 불충분하다고 예상되는 경우의 출혈 또는 담즙, 림프, 액, 공기누출 2. 간, 비장, 췌장, 신장, 폐, 부신, 갑상선, 림프절과 같은 실질적 기관 수술시의 지혈 및 조직접착, 또한 이비인후과, 부인과, 비뇨기과, 혈관계, 뼈(예를 들면 해면골)수술, 외상 관련 수술시의 지혈 3. 림프, 담즙, 액의 누출의 예방적 처치 4. 폐수술시 일어나는 공기누출의 봉합	적당한 크기(상처 부위보다 1~2cm 더 크게)가 되도록 무균가위로 잘라 약물이 도포되어 있는 면(황색면)을 상처부위에 적용하고, 3~5분간 손으로 압착	655300240	(2.5×3.0×0.5)cm ² ×1매
타코콤 4.8x4.8x0.5cm				655300230	(4.8×4.8×0.5)cm ² ×2매
타코콤 9.5x4.8x0.5cm				655300150	(9.5×4.8×0.5)cm ² ×1매
● 종 합 비 타 민 제					
오큐바이트	 아스코르빈산90%125.556mg/Ascorbic acid 90% 산화제이동0.501mg/Cupric Oxide 50% 초산토코페롤200.000mg/Tocopherol Acetate50% 베타카로틴10%42.960mg Zinc Oxide산화아연21.658mg	눈의 건조감의 완화, 야맹증, 말초혈행장애 및 경련기시 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증	성인:1일1회1정을 복용하거나, 의사의 지시에 따라 복용한다.	비급여	120T
● 구 강 용 제					
오키펜 액	 100ml 중 케토프로펜리신 1.6g	인두염, 치은염, 구내염, 발치전 후 염증의 완화	1회 10ml 1일 2회100ml의 물에 희석하여 입안을 행구어 내거나 기글한 후 빨음	642000900	500ml/병
● 검 사 용 시 약					
오라퀵 HCV		세계 유일 구강점막 C형감염 검사 키트 FDA승인 / 정확도 99.9% / 20분내 결과확인			25kit/100kit
오라퀵어드밴스 HIV		세계 유일 구강점막 HIV 항체시험 검사 키트 FDA승인 / 정확도 99.9% / 20분내 결과확인			25kit/100kit



일류의 보건향상에 기여하고자 기술제휴를 통하여,
전세계 우수 의약품 공급에 항상 최선을 다하겠습니다.



서울시 강남구 봉은사로 135(논현동) 현대약품빌딩
Tel. 080-024-5525 www.hyundaipharm.co.kr