



직원교육용

hyundai pharm

# PRODUCT LIST



가려울때!



긁지마요!

상처나요!



벌레물려 가려울 땐-  
**버물리**<sup>®</sup>



- 스펀지, 솔타입으로 경제적
- 레저활동 시 편리함



- 붙이는 벌레물림 치료제
- 투명이라 좋아요



- 마사지 하듯 동글동글
- 흐르지 않는 겔 타입

TV CF 방영중

버물리 홈페이지, 페이스북에서 확인하세요. [www.bumoolly.co.kr](http://www.bumoolly.co.kr) | [www.facebook.com/hdpharm.co](http://www.facebook.com/hdpharm.co)



## 복합 마이녹실 5%



### [특·장점]

유해산소로부터 피부를 보호하는 항산화작용의 토코페롤, 급만성/지루성 습진, 접촉성 피부염에 효과가 있는 피리독신을 복합 적용

### [원료약품 및 그분량] 1mL 중

미녹시딜(USP) .....	50mg
피리독신염산염(KP) .....	0.5mg
토코페롤아세테이트(KP) .....	0.8mg
L-멘톨(KP) .....	3mg

### [효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

### [용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약0.5mL~1mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

### [포장단위] 60mL

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 5%



### [특·장점]

전국 14개 대학병원 임상(170명)  
대한 피부과학회(2009;47(3):295~302)  
높은 치료효과 확인 92.9% 모발개수 및 굵기 증가

### [원료약품 및 그분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) .....	5.0g
-----------------	------

### [효능·효과]

남성형 탈모증 (남성에 한함)

### [용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약0.5mL~1mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

### [포장단위] 60mL, 315mL

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 플러스 클타입



### [특·장점]

L-멘톨 함유로 끈적임이 적고 시원한 프리미엄급 탈모증 치료제  
PG 미함유, 보습제 덱스판테놀 함유

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) ..... 5.0g

### [효능·효과]

남성형 탈모증 (단, 5%는 남성에 한함)

### [용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회(아침,저녁) 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 180mL, 360mL

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 3%



### [특·장점]

5%에 비해 부작용이 감소되어 예민한 여성의 두피에 맞춤형 제품  
PG 미함유로 두피 트러블 최소화.

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) ..... 5.0g

덱스판테놀(USP) ..... 1.0g

### [효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

### [용법·용량]

- 남성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5~1mL를 1일 2회 (아침, 저녁), 최소 4개월동안, 환부(질환부위)에만 바른다.  
2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.  
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.
- 여성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안, 환부(질환부위)에만 바른다.  
2) 1일 총 투여량이 1.3mL를 초과하지 않는다.  
3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 90mL, 180mL(리필용)

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 S 캡슐



### [특·장점]

남녀공용 비호르몬 성분의 먹는 탈모증 치료제 "1일 3회, 1회 1캡슐 복용"

### [원료약품 및 그분량] 1캡슐 중

케라틴(별규) .....	20mg
(총 아미노산으로서 L-트레오닌 2.97mg, L-페닐알라닌 2.41mg, L-이소로이신 2.70mg)	
약용효모(별규) .....	100mg
질산치아민(KP) .....	60mg
판토텐산칼슘(KP) .....	60mg
L-시스틴(KP) .....	20mg
파라아미노벤조산(USP) .....	20mg

### [효능·효과]

1) 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진 2) 탈모의 보조치료

### [용법·용량]

성인: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용 / 소아: 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

[포장단위] 90C, 180C, 360C [저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 겔 5%



### [특·장점]

국내 최초 흐르지 않는 겔 타입

마사지가 가능한 미니 둥근머리

휴대가 간편하여 여행시 편리!

### [원료약품 및 그분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) .....	5.0g
-----------------	------

### [효능·효과]

남성형 탈모증 (남성에 한함)

### [용법·용량]

1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회(아침, 저녁)

최소 4개월 동안 환부에만 바른다.

2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 15g [저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 겔 3%



### [특·장점]

손델 필요없이 두피에 직접 바르세요. 흐르지 않아 위생적인 겔타입

휴대가 간편하여 여행시 편리!

### [원료약품 및 그분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) .....	30mg
-----------------	------

### [효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

### [용법·용량]

남성: 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5~1mL를 1일 2회(아침

저녁), 최소 4개월동안, 환부(질환부위)에만 바른다.

2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

여성: 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL를 1일 2회(아침, 저

녁), 최소 4개월동안, 환부(질환부위)에만 바른다.

2) 1일 총 투여량이 1.3mL를 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 15g [저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

## 등근머리 버물리겔



### [특·장점]

흐르지 않고 흡수가 빠른 겔타입 제형!

마사지 기능의 등근머리 용기, 벌레물려 가려울 땀 - 버물리

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

DL - 캄파(KP) .....	3g
살라실산메틸(KP) .....	3g
L - 멘톨(KP) .....	3g
디부카인염산염(KP) .....	0.3g
디펜히드라민염산염(KP) .....	2g
에녹솔론(KPC) .....	0.2g

### [효능·효과]

습진, 피부염, 미란(긁무름), 찰뽕, 옷 등에 의한 접촉피부염, 가려움, 동상(언상차) 벌레물린데, 두드러기

### [용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 25g, 50g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 등근머리 버물리키드크림



### [특·장점]

연약한 피부의 유아와 여성을 위한 저자극 크림타입 제형

생후 1개월 이상 사용가능

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

디펜히드라민(KP) .....	10mg
덱스판테놀(USP) .....	10mg
토코페롤아세테이트(KP) .....	10mg
글리시리진산이칼륨(KP) .....	5mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1mg	
파라옥시벤조산프로필 1mg	

### [효능·효과]

가려움, 피부염, 피부병, 습진, 두드러기, 찰뽕, 동상, 벌레물림, 긁무름

### [용법·용량]

1일 수회(여러차례) 환부(질환부위)에 적당량을 바른다.

[포장단위] 25g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 버물리에스액 스펀지타입



### [특·장점]

벌레물림시장 No.1 브랜드 버물리!  
30개월 이상부터 사용할 수 있어요~  
오랜시간 사랑받은 우리가족 여름상비약!

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

DL - 캄파(KP) .....	30mg/mL
L - 멘톨(KP) .....	30mg/mL
살라실산메틸(KP) .....	30mg/mL
디펜히드라민염산염(KP) .....	20mg/mL
디부카인염산염(KP) .....	3mg/mL
에녹솔론(KPC) .....	2mg/mL

### [효능·효과]

습진, 피부염, 미란(긁무름), 땀띠, 옷 등에 의한 접촉피부염, 가려움, 동상(언상차)  
벌레물린데, 두드러기

### [용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 50ml

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 버물리에스액 솔타입



### [특·장점]

가려울때 긁어주는 편리한 솔타입  
LDPE 특수재질로 부드럽고 위생적  
벌레물려 가려움엔 - 버물리, 우리가족 여름 상비약 버물리

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

DL - 캄파(KP) .....	30mg/mL
L - 멘톨(KP) .....	30mg/mL
살라실산메틸(KP) .....	30mg/mL
디펜히드라민염산염(KP) .....	20mg/mL
디부카인염산염(KP) .....	3mg/mL
에녹솔론(KPC) .....	2mg/mL

### [효능·효과]

습진, 피부염, 미란(긁무름), 땀띠, 옷 등에 의한 접촉피부염, 가려움, 동상(언상차)  
벌레물린데, 두드러기

### [용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 50ml

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 버물 이카리딘케어



### [특·장점]

모기와 털진드기에 2.5시간 기피효과로 아웃도어 활동에 필수품목!  
생후 6개월부터 버물케어하세요!

**[원료약품 및 그 분량]** 100g 중

이카리딘(별규) ..... 7.0g

### [효능·효과]

모기, 털진드기의 기피제

### [용법·용량]

- 1) 모기 기피제로 사용시, 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다.
- 2) 털진드기 기피제로 사용시 피부에 똑바로 세워 고루 분무한다.

**[포장단위]** 60mL

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 버물리 플라스타



### [특·장점]

붙이는 벌레물림 치료제 - 의약품 플라스타 제형  
옷에 묻지 않아요. 투명하게 붙이세요!

해외여행 갈 때, 아웃도어 활동에 포켓에 쏙~!

**[원료약품 및 그 분량]** 1매 중

디펜히드라민(KP) ..... 0.493mg

이소프로핀메틸페놀(별규) ..... 0.493mg

L-멘톨(KP) ..... 1.478mg

### [효능·효과]

벌레물린데, 가려움, 등창(언 상처)

### [용법·용량]

1일 1~수회(여러차례), 1회 1매씩 환부(질환부위)에 붙인다.

**[포장단위]** 42매

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 더마화이트



### [특·장점]

트라넥삼산을 함유한 신개념 기미전용 치료제  
기존 기미치료성분인 엘시스테인, 비타민C, 판토텐산칼슘에 강력한 미백성분인 트라넥삼산과 피리독신을 추가  
2개월 요법제로 복용시 만족스러운 치료효과를 기대할 수 있습니다.

### [원료약품 및 그분량] 1정 중

트라넥삼산(KP)	125mg
제피아스코르브산(별규)	53mg
(아스코르브산으로 50mg)	
엘시스테인(JP)	40mg
판토텐산칼슘(KP)	4mg
피리독신염산염(KP)	1mg
동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)	

### [효능·효과] 기미

### [용법·용량]

15세 이상 1회 2정, 1일 3회 식후복용, 15세 미만은 복용하지 마십시오.  
용법/용량은 엄수하여 주시기 바랍니다.

### [포장단위] 180정 x 2EA

### [저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 등근머리 물팍스겔



### [특·장점]

국내 최초 6가지 복합성분의 프리미엄 겔.  
야외활동이 많은 2030 Young People을 위한 등근머리 물팍스겔.  
뱀, 근육통, 타박상에 맞춤형 제품으로 청량감과 염증완화 효과.  
효과적인 마사지 기능의 등근머리 용기를 적용하여 손목, 발목 등 굴곡진 부위도 부드럽게~

### [원료약품 및 그분량] 1g 중

살리실산메틸(KP)	30mg
dl-칼파(KP)	80mg
I-멘톨(KP)	70mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1mg
토코페롤아세테이트(KP)	1mg
에녹솔론(BP)	0.5mg

### [효능·효과]

다음 증상의 소염(항염)·진통 : 뱀, 타박상, 근육통, 요통(허리통증), 어깨결림  
신경통, 류마티스 통증, 동창(언 상처)

### [용법·용량]

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

### [포장단위] 50g

### [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 히루도이드포르테겔



### [특·장점]

하지부종 및 혈행촉진, 보습 및 항염증·진통작용의 프리미엄 치료제

**[원료약품 및 그 분량]** 100mL 중

뮤코폴리사카리드폴리설페이트(KP) ..... 4.45mg

### [효능·효과]

1. 정맥류에 의한 증상 : 통증, 무거운 느낌, 하지부종
2. 사고 또는 스포츠에 의한 손상 : 혈종, 타박상, 염좌(뺨), 부기, 근육 및 인대의 통증

### [용법·용량]

성인의 경우, 1회 적용 시 이 약 3~5cm 정도를 환부에 바르며 1일 수회 바른 다. 이 약을 바른 부위는 붕대로 감지 않는다.

**[포장단위]** 40g

**[저장방법]** 기밀용기, 상온(15~25℃)보관

## 등근머리 통에존에스겔



### [특·장점]

관절염, 근육통에 바르는 진통·소염제

**[원료약품 및 그 분량]** 1g 중

피록시캄(KP) ..... 5mg

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1.8mg

파라옥시벤조산프로필 0.2mg

### [효능·효과]

퇴행성 관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건·건초염, 건주위염, 상완 골상과염(테니스엘보우)

### [용법·용량]

성인 1회 1g(약 3cm), 1일 3~4회 환부(질환부위)에 바르고 잘 스며들도록 가볍게 문지른다.

**[포장단위]** 50g

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 현대 물파스에프



### [특·장점]

물파스의 원조 토끼표 물파스

[원료약품 및 그분량] 100mL 중

살리실산 메칠(KP) .....	3g
d-캄파(KP) .....	7g
I-멘톨(KP) .....	7g
클로르페니라민말레산염(KP) .....	0.1g
토코페롤아세테이트(KP) .....	0.1g
글리시레틴산(BP) .....	0.05g

### [효능·효과]

다음 증상의 소염·진통 : 뱀, 타박상, 근육통, 요통, 어깨걸림, 신경통, 류마티스 통증

### [용법·용량]

1일 1회~수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 88mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30C) 보관

## 현대 에어파스맥스



### [특·장점]

빠른 소염·진통작용 분사력·청량감 강화, 사용이 간편한 원터치 캡

[원료약품 및 그분량] 100g 중

I-멘톨(KP) .....	5.02g
d- 캄파(KP) .....	4.71g
살리실산메칠(KP) .....	2.75g
디펜히드라민(KP) .....	0.063g

### [효능·효과]

뻐데, 멍든데, 타박상, 근육통 치료의 보조

### [용법·용량]

1일 1회~수회 환부에 적당량을 바른다.

[포장단위] 200mL

[저장방법] 기밀용기, 화기를 피하여 냉소에 보관

## 시노카엔캡슐



### [특·장점]

코감기 전문 치료제

**[원료약품 및 그분량]** 1캡슐 중

벨라돈나총알카로이드(별규) .....	0.13mg
(히오스시아민으로서 0.1235mg)	
클로르페니라민말레산염(KP) .....	4mg
페닐레프린염산염(KP) .....	3.33mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호	
동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)	

### [효능·효과]

코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화: 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통(목구멍 통증), 머리 무거움

### [용법·용량]

성인: 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 솔루샷클 연질캡슐



### [특·장점]

효과빠른 액상형 종합감기약

**[원료약품 및 그분량]** 1캡슐(1,280mg)중

아세트아미노펜(KP) .....	200.0mg
구아이페네신(KP) .....	41.6mg
슈도에페드린염산염(USP) .....	15.0mg
덱스트로메토르판부름화수소산염수화물(KP)(비고: 일수화물) .....	8.0mg
클로르페니라민말레산염(KP) .....	1.25mg
d-메틸에페드린염산염(KP) .....	6.25mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호	

### [효능·효과]

감기의 증상상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

### [용법·용량]

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 슬루샷코프 연질캡슐



### [특·장점]

효과빠른 액상형 목감기약

**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐(1,190mg)중

아세트아미노펜(KP) ..... 200.0mg  
 구아이페네신(KP) ..... 41.6mg  
 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고 : 일수화물) ..... 8.0mg  
 dl-메틸에페드린염산염(KP) ..... 12.5mg  
 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호

### [효능·효과]

감기의 증상(여러증상)(인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

### [용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 슬루샷노즈 연질캡슐



### [특·장점]

효과빠른 액상형 코감기약

**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐(1,190mg)중

아세트아미노펜(KP) ..... 200.0mg  
 슈도에페드린염산염(USP) ..... 15.0mg  
 클로르페니라민말레산염(KP) ..... 1.25mg  
 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호

### [효능·효과]

감기의 증상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

### [용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 솔루펜 / 솔루펜 무색소



### [특·장점]

강력한 진통효과, 신속한 효과발현. 위장장애 개선

액상타입의 빠른 효과

**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐 중

덱사부프로펜(별규) ..... 300mg

**[효능·효과]**

급성 및 만성 관절염 : 다발성 관절염, 류마티스관절염 등  
 염증성 류마티스 질환 : 강직성 척추염, 근육 류마티즘, 외상 및 수술 후 통증성 부  
 종 또는 염증, 염증, 통증 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조

**[용법·용량]**

성인 : 1회 1캡슐을 1일 3~4회 식사시 경구투여

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 시노코프캡슐



### [특·장점]

디프로필린 처방의 기침감기 전문치료제

**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐 중

디프로필린(USP) ..... 37.5mg

d-메틸에페드린염산염(KP) ..... 3.1mg

덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고:일수화물) ..... 10mg

디펜히드라민염산염(KP) ..... 7.5mg

첨가제(타르색소) : 유당(소의 젖), 스테아라산마그네슘(소의 우지)

**[효능·효과]**

기침, 가래

**[용법·용량]**

연령(나이)에 따라 다음 용량을 1일 3회, 식후 30분에 복용하십시오.

만 15세 이상 : 1회 2캡슐

만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1캡슐 (단, 만 11세 이상~만 15세 미만은 1일 4회 복용한다.)

만 8세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1회 1캡슐

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 한생액 보틀형



### 【특·장점】

다섯가지 생약성분이 함유된 한방기침약

### 【원료약품 및 그 분량】 100ml 중

맥문동 30% 에탄올 유동엑스(별규)	4.17mL
남천실 30% 에탄올 유동엑스(별규)	3.125mL
(o-메틸도메스티신으로서 2.5mg)	
감초엑스(3→1)(별규)	1,250mg
(글리시리진산으로서 93.8mg)	
길경 33.3% 에탄올 유동엑스(4→1)(별규)	625mg
우황(KP)	6.25mg
(결합형 빌리루빈으로서 0.75mg)	
구아아쿨설펜산칼륨(KP)	375mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	156.3mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필	10mg

【효능·효과】 기침, 가래, 천식

### 【용법·용량】

성인 1회 : 8mL / 소아 1회 : 11세 이상~15세 미만 : 5mL, 8세 이상~11세 미만 : 4mL, 3세 이상~8세 미만 : 2mL, 2세 이상~3세 미만 : 1.5mL 1일 3회 복용한다.

1일 6회까지 복용할 수 있고 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【포장단위】 75mL 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 한생액 파우치형



### 【특·장점】

다섯가지 생약성분이 함유된 한방기침약

### 【원료약품 및 그 분량】 100ml 중

맥문동 30% 에탄올 유동엑스(별규)	4.17mL
남천실 30% 에탄올 유동엑스(별규)	3.125mL
(o-메틸도메스티신으로서 2.5mg)	
감초엑스(3→1)(별규)	1,250mg
(글리시리진산으로서 93.8mg)	
길경 33.3% 에탄올 유동엑스(4→1)(별규)	625mg
우황(KP)	6.25mg
(결합형 빌리루빈으로서 0.75mg)	
구아아쿨설펜산칼륨(KP)	375mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	156.3mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필	10mg

【효능·효과】 기침, 가래, 천식

### 【용법·용량】

성인 1회 : 8mL / 소아 1회 : 11세 이상~15세 미만 : 5mL, 8세 이상~11세 미만 : 4mL, 3세 이상~8세 미만 : 2mL, 2세 이상~3세 미만 : 1.5mL 1일 3회 복용한다.

1일 6회까지 복용할 수 있고 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【포장단위】 8mL x 10포 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 스토마신캡슐



### 【특·장점】

구풍해독탕 배합, 생약성분의 항염증제

### 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

구풍해독탕건조엑스(별규) .....	685mg
방풍(KP) .....	500mg
우방자(KP) .....	500mg
연교(KP) .....	835mg
헝개(KP) .....	250mg
강활(KP) .....	250mg
감초(KP) .....	250mg
길경(KP) .....	500mg
석고(생규) .....	1665mg

동물유래성분 : 유당(젖소의 우유)

### 【효능·효과】

인후(목구멍)가 부어서 아픈 다음 증상 : 편도염, 편도주위염

### 【용법·용량】

보통 성인 1회 2캡슐, 1회 7~14세 성인 용량의 2/3(4/3캡슐), 4~6세 성인 용량의 1/2(1캡슐), 2~3세 성인 용량의 1/3(2/3캡슐), 1세 이하 성인용량의 1/4(1/2캡슐)을 1일 3회 식전 또는 식간에 미지근한 물에 녹여서 입이나 목 등을 적셔가면서 소량씩 천천히 복용한다.(캡슐로 삼키지 말 것.)

【포장단위】 10캡슐 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 속시탈과립



### 【특·장점】

속이 달나면 속시탈! 위통, 속쓰림, 소화불량  
효과 빠른 과립형 위장질환 치료제 날개포 판매가능

### 【원료약품 및 그 분량】 약 1.5g 중

말레인산트리메부틴(KPC) .....	100mg
비오디아스타제 2000IV(KPC) .....	40mg
리파제 II (KPC) .....	15mg
감초가루 (KP) .....	50mg
(글리시리진산으로서 1.25mg)	
스코폴리아엑스(KP) .....	10mg
침강탄산칼슘(KP) .....	200mg
메타규산알루미늄(건조물로서)(KPC) .....	80mg
(산화알루미늄으로서 25.84mg, 산화마그네슘으로서 10.16mg)	
탄산수소나트륨(KP) .....	100mg

### 【효능·효과】

위산 과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 심트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

### 【용법·용량】

성인 : 1회 1.5g(1포) 씩, 1일 3회 식후복용

【포장단위】 1.5g x 30포 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 댄스탑 외용액



### [특·장점]

비듬, 지루피부염, 어루러기

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

케토코나졸(USP) ..... 2g  
 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.1g, 파라옥시벤조산프로필 0.1g

### [효능·효과]

효모균(Pityrosporum)에 의한 다음의 피부질환 : 비듬, 지루피부염, 어루러기

### [용법·용량]

감염부위(몸통, 얼굴, 두피, 머리카락)에 이 약을 바르고 일반 샴푸처럼 3~5분간 적용한 후 행구어 낸다.

[포장단위] 100mL

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관

## 누보클렌액



### [특·장점]

살균, 소독, 상처치료에 유효한 복합성분

[원료약품 및 그 분량] 100ml 중

클로르헥시딘글루콘산염(EP) ..... 1.0ml  
 (글루콘산클로르헥시딘으로서 0.2g)  
 디펜히드라민염산염(USP) ..... 0.3g  
 디부카인염산염(USP) ..... 0.1g  
 나파졸린염산염(약전) ..... 0.1g  
 알란토인(USP) ..... 0.2g

### [효능·효과]

긁힌 상처, 베인 상처, 창상, 손과 손가락의 살균, 소독, 치질인 경우의 항문 살균 소독

### [용법·용량]

1일 1~수회 적당량을 환부에 바른다.

[포장단위] 50mL

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 나프젠액



## 【특·장점】

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어 염증성변화를 수반하는 진균증에 탁월한 효과, 손·발톱 무좀까지 허가

## 【원료약품 및 그 분량】 30ml 중

나프티핀염산염 ..... 10mg

## 【효능·효과】

다음의 피부진균증

- 1) 백선 : 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증 3) 어루러기 4) 조갑(손·발톱) 진균증

## 【용법·용량】

- 1) 피부진균증 : 1일 1회 환부를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱)진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

## 【포장단위】 30mL

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 나프젠크림



## 【특·장점】

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어 염증성변화를 수반하는 진균증에 탁월한 효과, 손·발톱 무좀까지 허가

## 【원료약품 및 그 분량】 30g 중

나프티핀염산염 ..... 10g

## 【효능·효과】

다음의 피부진균증

- 1) 백선 : 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증 3) 어루러기 4) 조갑(손·발톱) 진균증

## 【용법·용량】

- 1) 피부진균증 : 1일 1회 환부를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱)진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

## 【포장단위】 30g

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 디나펜 플라스타



### [특·장점]

붙이는 관절염 치료제. 먹는 디클로페낙나트륨을 간편하게  
외상 후 부기 제거에 효과적인 단 하나의 NSAID  
24시간 지속효과

**[원료약품 및 그 분량]** 약 1매(70cm, 2.4g) 중

디클로페낙나트륨(BP) ..... 15mg

### [효능·효과]

- 1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 어깨관절 주위염
- 3) 힘줄 및 힘줄윤활막염 4) 힘줄주위염
- 5) 위팔뼈상과염(테니스 엘보 등)
- 6) 근육통(근,근막성요(허리)통증 등)
- 7) 외상(상처) 후 부기 및 통증

### [용법·용량]

성인(15세 이상) : 1일 1회 1매를 환부(질환부위)에 붙입니다.  
단, 15세 미만은 사용하지 않습니다.

**[포장단위]** 10매

**[저장방법]** 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

## 통에존 콜 플라스타



### [특·장점]

관절 깊숙이 더 빠르게

**[원료약품 및 그 분량]** 1매 중

펠비낙(BP) ..... 35mg

### [효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염 :

- 1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 어깨관절주위염
- 3) 건·건초염 건주위염
- 4) 상완골상과염(테니스 엘보우 등) 5) 근육통
- 6) 외상후의 종창·동통

### [용법·용량]

약면의 바리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부에 부착

**[포장단위]** 10매

**[저장방법]** 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

## 플로스탑 플라스타



### [특·장점]

관절 깊은 곳의 통증까지 더 빠르고 시원하게

**[원료약품 및 그분량]** 1매(10cm) 중

플루르비프로펜(KP) ..... 2.8571mg

### [효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염:

- 1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 어깨관절주위염
- 3) 건·건초염 건주위염
- 4) 상완골상과염(테니스 엘보우 등)
- 5) 근육통 6) 외상후의 종창·동통

### [용법·용량]

약면의 바리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부에 부착

**[포장단위]** 10매

**[저장방법]** 차광기밀용기, 25℃ 이하보관

## 케프로텍 플라스타



### [특·장점]

빠르고 시원한 관절염 근육통 치료제

**[원료약품 및 그분량]** 1매(10cm) 중

케토프로펜(KP) ..... 4.2857mg

### [효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염:

- 1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 어깨관절주위염
- 3) 건·건초염 건주위염
- 4) 상완골상과염(테니스 엘보우 등)
- 5) 근육통 6) 외상후의 종창·동통

### [용법·용량]

약면의 바리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부에 부착

**[포장단위]** 10매

**[저장방법]** 차광기밀용기, 25℃ 이하보관

## 오큐바이트 프리저비전



## [특·장점]

세계판매 1위! AREDS연구로 임상효과 입증, 눈 전문 고단위 항산화제

## [원료약품 및 그분량] 1정 중

50% 초산토코페롤 ..... 200mg (비타민E로서 100 IU)  
 베타카로틴 10% ..... 42.960mg (베타카로틴으로서 7.160 IU)  
 아스트코르빈산 90% ..... 125.556mg  
 (아스트코르빈산으로서 113mg)  
 산화제이동 ..... 0.501mg (구리로서 0.4mg)  
 산화아연 ..... 21.658mg (아연으로서 17.4mg)

## [효능·효과]

눈의 건조함의 완화, 야맹증, 말초혈행장애 및 광변기시 다음 증상의 완화:  
 어께, 목 결림, 수족저림, 수족냉증

## [용법·용량]

1일 1회 1정을 복용하거나, 의사에 지시에 따라 복용한다.

## [포장단위] 120T

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1-30°C)보관

## 루핑점안액 1회용



## [특·장점]

히알루론산 첨가 국내최초 OTC 인공누액

## [원료약품 및 그분량] 1mL 중

염화나트륨(JP) ..... 7.4mg  
 염화칼륨(JP) ..... 1.3mg  
 히프로멜로오스(JP) ..... 2mg

## [효능·효과]

눈의 피로, 누액(눈물)의 보조(눈의 건조)  
 하드콘택트렌즈 또는 소프트렌즈 착용 시 불편감  
 눈의 침침함(눈곱이 많을 때) 등

## [용법·용량]

1일 3~6회, 1회 1~3방울 점안(눈에 넣을 때)한다.

## [포장단위]

30EA, 36EA

## [저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 비타엑티브 연질캡슐



**[특·장점]** 옥체피로회복, 체력저하개선, 빈혈예방 및 치료, 발육기, 임신, 수유기, 노년기  
**[원료약품 및 그분량]** 1캡슐(1,370mg) 중  
 셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 50 $\mu$ g)(발규) ..... 38.462mg  
 푸르셀티아민(KP) ..... 6.00mg  
 시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 4.9 $\mu$ g)(KP) ..... 4.9mg  
 리보플라빈부티레이트(KP) ..... 6.00mg  
 $\beta$ -카로틴현탁액 30%( $\beta$ -카로틴으로서 6mg)(KP) ..... 20.00mg  
 산화아연(아연으로서 4.02mg)(KP) 5.00mg  
 비오틴(USP) ..... 0.045mg  
 판토텐산칼슘(KP) ..... 20.00mg  
 아스코르브산(KP) ..... 100.00mg  
 황산제아구리(구리로서 0.5mg)(EP) 1.255mg  
 $\gamma$ -오리자놀(KP) ..... 5.00mg  
 토코페롤아세테이트(비타민E로서 200 I.U) ..... 200.00mg  
 니코틴산아미드(KP) ..... 20.00mg  
 무수인산수소칼슘(인으로서 13.66mg, 칼슘으로서 17.67mg)(KP) ..... 60.00mg  
 산화마그네슘(마그네슘으로서 6.03mg)(KP) ..... 10.00mg  
 유비데카레논(KP) ..... 5.00mg  
 폴산(KP) ..... 0.40mg  
 농축콜레칼시페롤(유상)(비타민D로서 첨가제(타르색소) : 황색5호, 적색40호, 청색1호 400 I.U)(BP) ..... 0.40mg

**[효능·효과]**

- 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급  
 - 옥체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시  
 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.  
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움) - 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방
- 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

**[용법·용량]** 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

**[포장단위]** 50캡슐, 100캡슐 **[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30 $^{\circ}$ C) 보관

## 루마콘300 연질캡슐



**[특·장점]**

콘드로이틴설페이트나트륨 강화 300mg  
 신경통, 근육통, 관절통, 요통, 견통, 어깨/목 결림, 수족저림, 수족냉증

**[원료약품 및 그분량]** 1캡슐(1,590mg) 중

콘드로이틴설페이트나트륨(KP) ..... 300mg  
 티아민질산염(KP) ..... 25mg  
 토코페롤아세테이트(비타민E로서 50 I.U)(KP) ..... 50mg  
 판토텐산칼슘(KP) ..... 30mg  
 니코틴산아미드(KP) ..... 30mg  
 피리독신염산염(KP) ..... 25mg  
 시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 30 $\mu$ g)(KP) ..... 30mg  
 마늘엑스(100 $\rightarrow$ 1)(생규) ..... 2mg  
 첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색203호, 청색1호

**[효능·효과]**

- 다음 경우의 비타민 E, B1, B6의 보급: 1) 옥체피로 2) 임신·수유기 3) 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 4) 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.:  
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)  
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통(어깨통증)등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기·눈의 피로

**[용법·용량]** 만 8세 이상 어린이 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 씹 식후복용

**[포장단위]** 60캡슐, 120캡슐 **[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30 $^{\circ}$ C) 보관

## 케라네일캡슐



### [특·장점]

손톱의 발육부진, 국내 최초 손톱영양제 컨셉의 의약품  
손톱무좀 치료제와 병용 사용시 빠른 효과  
24시간 지속효과

### [원료약품 및 그분량] 1캡슐 중

약용효모(별규) ..... 100mg  
케라틴(별규) ..... 20mg  
(총 아미노산으로서 L-트레오닌 2.97mg, L-페닐알라닌 2.41mg,  
L-이소로이신 2.70mg)  
티아민질산염(KP) ..... 60mg  
판토텐산칼슘(KP) ..... 60mg  
L-시스틴(KP) ..... 20mg  
p-아미노벤조산(USP) ..... 20mg  
첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 황색203호, 청색1호  
첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

### [효능·효과]

1) 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육부진 2) 탈모의 보조치료

### [용법·용량]

성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용  
소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

[포장단위] 63C x 2EA [저장방법] 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

## 리버 350



### [특·장점]

실리마린 고품질 간질환 치료제  
카르두스마리아누스엑스 350mg(국내 최고함량)

### [원료약품 및 그분량] 1캡슐 중

밀크시슬엑스(KPC) ..... 350mg  
(실리마린으로서 196mg)  
첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호

### [효능·효과]

다음 질환의 보조치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

### [용법·용량]

1일 1회, 1회 1캡슐

### [포장단위]

120C (60C x 2EA)

### [저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 헤모라민 필름형트로키



### [특·장점]

간편하게 물없이 녹여먹는 빈혈치료제  
복약순응도 GOOD! 휴대가 간편하며 흡수가 빠릅니다.

### [원료약품 및 그 분량] 1장(112mg) 중

폴리말도오스수산화제이철착염(KP) ..... 50mg (철로서 14mg)  
폴산(KP) ..... 150μg

### [효능·효과]

철결핍성 빈혈의 예방 및 치료

### [용법·용량]

1일 2회, 1회 1장을 씹거나 삼키지 말고 입안에서 천천히 녹여 복용한다.  
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

### [포장단위]

4매 x 20EA

### [저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

## 헤파멜즈로라액



### [특·장점]

독일 오리지널 LOLA(L-Omitine-L-Aspartate) 3,000mg 함유  
간해독 작용과 간세포 회복의 Dualaction  
만성피로와 집중력 저하 개선

### [원료약품 및 그 분량] 1병 (30mL) 중

L-아스파르트산-L-오르니틴(DAB) ..... 3g

### [효능·효과]

다음의 중증의 간질환 해독의 보조치료: 간경변, 만성간염

### [용법·용량]

1. 만성간염: 심한 증상에서 L-아스파르트산-L-오르니틴으로서 1회 3g, 1일 1~2회 식후에 복용한다.
2. 간경변: 가벼운 증상에서 L-아스파르트산-L-오르니틴으로서 6g 1일 2회 많은 양의 물에 녹여 식후에 복용한다.

### [포장단위]

30mL x 100BTL

### [저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 라니아정



## [특·장점]

사후피임약 No.1 노레보의 현대약품이 만든 순한 피임약  
에스트로겐 함량 최저, 오심, 구토, 복부 팽만감 등 부작용 최소화  
2세대 피임약의 혈전생성률 최저

## [원료약품 및 그분량] 1정 중

레보노르게스트렐(EP) ..... 0.1mg  
에티닐에스트라디올(EP) ..... 0.02mg  
첨가제(타르색소) : 알루미늄아세테이트 AC 알루미늄레이크  
인디고카르민 알루미늄레이크

첨가제(동물유래성분) : 유당(소의 우유)

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.1g, 파라옥시벤조산프로필 0.1g

## [효능·효과]

피임, 이 약을 복용할 수 있는 여성의 중증도의 여드름 치료

## [용법·용량]

1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용중지)한다.

매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.

(자세한 내용은 첨부문서를 참조하십시오.)

## [포장단위] 21정

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1-30°C)보관

## 보니타정



## [특·장점]

머시론 1st 제네릭 제품(최초, 유일)

에스트로겐 함량 최저

3세대피임약으로 부종, 다모, 우울감 등 최소화

## [원료약품 및 그분량] 1정 중

데소게스트렐(별규) ..... 0.15mg  
에티닐에스트라디올(별규) ..... 0.02mg  
첨가제(타르색소) : 알루미늄아세테이트 AC 알루미늄레이크  
인디고카르민 알루미늄레이크

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)

## [효능·효과]

피임

## [용법·용량]

1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용중지)한다.

매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.

(자세한 내용은 첨부문서를 참조하십시오.)

## [포장단위] 21정

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 바로테스트 센스



### [특·장점]

Whole hCG 검출법을 적용한 High Quality 제품.

불량율 0%에 도전하는 고품질 임신 진단시약

### [원료약품 및 그 분량] 1테스트 중

마우스 항 hCG 단일클론항체1 (체외진단용) ..... 0.15± 0.03 $\mu$ g

마우스 항 hCG 단일클론항체2 (체외진단용) ..... 0.8± 0.16 $\mu$ g

항 마우스 면역글로불린지 (체외진단용) ..... 1.0± 0.2 $\mu$ g

### [효능·효과]

노종의 hCG(Human Chorionic Gonadotropin)검사를 통한 임신의 진단

### [용법·용량]

생리에정일 7일 이후에 검사 실시

### [포장단위]

1키트

### [저장방법]

기밀용기, 실온(1~30 $^{\circ}$ C) 보관

## 현대 아시클로버 크림



### [특·장점]

구순포진, 생식기포진, 각종 바이러스 질환에 현대약품 아시클로버

### [원료약품 및 그 분량] 1g 중

아시클로버(BP) ..... 50mg

### [효능·효과]

단순포진 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진과 구순포진 포함)

### [용법·용량]

1. 이 약은 약 4시간 간격으로 1일 5회 환부(질환부위)에 바른다.

2. 치료는 5일 간 계속하여야 하며, 5일 간 사용 후에도 치료되지 않을 경우에는 5일 간 더 사용 할 수 있다.

### [포장단위]

5g

### [저장방법]

기밀용기, 실온(1~30 $^{\circ}$ C) 보관

## 트랜스이엑스겔



### [특·장점]

고품질 수용성 윤활 젤리 겔타입  
질내 건조증을 가진 여성분들에게 적합한 윤활제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

글리세린(KP) ..... 170mg/g

### [효능·효과]

직장온도계, 탐폰, 기타기구(관장기, 관주기, 카테타 등)의 체강내 삽입시의 윤활제, 질내 윤활제

### [용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 줌.

### [포장단위]

100g

### [저장방법]

실온보관, 기밀용기, 3년

## 블리스텍스 립 바이브런스



### [특·장점]

입술의 톤을 살려주는 아름다운 색조와 펄의 조화  
강력한 고보습 제품

### [전성분]

다이메티콘, 옥시벤존, 옥티녹세이트, 향료, 미네랄오일,  
마이크로크리스탈린왁스, 아주까리씨유, 포도씨유

### [효능·효과]

강력한 보습효과로 민감한 입술의 보호

### [용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 줌.

### [포장단위]

3.69g

### [유통기한]

제조일로부터 3년(제조일자 제품일면 표기)

## 블리스텍스 센시티브



### [특·장점]

코코아버터와 시어버터 추출물 함유  
민감한 입술에 저자극성 보습효과

### [전성분]

페트롤라툼, 카카오씨드버터, 하이드록시스테아릭애씨드, 쉐어버터,  
페녹시에탄올

### [효능·효과]

민감한 입술에 저자극성의 보습 효과와 편안함 제공

### [용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 줌.

### [포장단위]

4.25g

### [유통기한]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

## 블리스텍스 딥 리뉴얼



### [특·장점]

코엔자임큐텐, 히알루론산 함유로 건강한 입술 유지  
탁월한 보습효과

### [전성분]

호호바에스터, 캐스터씨유, 다이메티콘, 비즈왁스, 민트오일,  
마이크로크리스탈린왁스

### [효능·효과]

튼 입술의 보호와 수분 공급을 통한 재생 효과

### [용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 줌.

### [포장단위]

3.7g

### [유통기한]


제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

# 1. 국내 제약업계 최초로 CCM 재 인증

지난 2008년 “소비자 중심경영(Consumer Centered Management : 이하 CCM)” 을 도입, 소비자 불만을 사전에 예방하고 신속하게 사후구제를 처리할 수 있는 내부실행체계를 구축하여 소비자만족에 앞장서 왔던 현대약품(주)은 2008년 제약업계 최초 CCM인증에 이어 2016년에 4차 재인증을 받음으로 명실상부히 소비자 신뢰를 얻는 회사로서의 이미지를 굳건히 하였습니다.



## 2. 현대약품(주) CCM의 특징

현대약품(주) CCM(소비자 중심 경영 프로그램)은 소비자에게 불만이나 피해가 발생할 경우 현대약품(주) 내부에서 신속, 정확하게 소비자 문제를 해결하고 이를 소비자와 소통하는 것을 목표로 설정하여 이를 시행하고 있습니다.



## 3. CCM 인증서

제약업계 최초 CCM 우수기업 2016년 4차 재인증 (16년 10월)  
CCM(소비자 중심경영 프로그램) 우수기업 인증 (공정거래 위원회)



**현대약품 강남본사**

서울특별시 강남구 봉은사로 135, 현대약품빌딩  
1666-9979

**현대약품 서부지점**

서울특별시 강서구 양천로 588, 3층  
02-3662-2411

**현대약품 충청지점**

대전광역시 중구 계룡로 786, 사학연금회관 504호  
042-541-6672

**현대약품 부산지점**

부산광역시 금정구 중앙대로 1925, 금정타워 7층  
051-516-7342

**현대약품 중부지점**

서울특별시 광진구 능동로 247, 유원빌딩 4층  
02-3662-2411

**현대약품 동부지점**

경기도 군포시 고산로 148길 17, 군포IT밸리 B동 1901호  
031-8086-7191

**현대약품 광주지점**

광주광역시 광산구 하남대로 148, 2층  
062-951-6672

**현대약품 대구지점**

대구광역시 수성구 들안로 149, 3층  
053-761-9305



현대약품(주)

현대약품 소비자상담실 1666-9979  
[www.hyundaipharm.co.kr](http://www.hyundaipharm.co.kr)

