



hyundai pharm

| 직원교육용 |

# PRODUCT LIST

복합마이녹실 모델  
배우 이종혁



## 복합

**비타민**  
두피를 건강하게

+

**L-멘톨**  
두피를 시원하게

프리미엄  
정량캡



부작용이 있을 수 있으니 청부된 '사용상의 주의사항'을 잘 읽고, 의사·약사와 상담하십시오.  
일반의약품 | 광고심의필/2019-1469-001102



복합 마이녹실 5%



**【특·장점】**

유해산소로부터 피부를 보호하는 항산화작용의 토코페롤, 급만성/지루성 습진, 접촉성 피부염에 효과가 있는 피리독신을 복합 적용

**【원료약품 및 그분량】 1mL 중**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 미녹시딜(USP) .....     | 50mg  |
| 피리독신염산염(KP) .....   | 0.5mg |
| 토코페롤아세테이트(KP) ..... | 0.8mg |
| L-멘틀(KP) .....      | 3mg   |

**【효능·효과】**

남성형 탈모증(안드로제탈모증)의 치료

**【용법·용량】**

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

**【포장단위】** 60mL, 240mL

**【저장방법】** 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

마이녹실 5%



**【특·장점】**

전국 14개 대학병원 임상(170명)  
대한 피부과학회(2009;47(3):295~302)  
높은 치료효과 확인 92.9% 모발개수 및 굵기 증가

**【원료약품 및 그분량】 100mL 중**

|                 |      |
|-----------------|------|
| 미녹시딜(USP) ..... | 5.0g |
|-----------------|------|

**【효능·효과】**

남성형 탈모증 (남성에 한함)

**【용법·용량】**

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

**【포장단위】** 60mL, 315mL

**【저장방법】** 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 플러스 쿨타입



### [특·장점]

L-멘톨 함유로 끈적임이 적고 시원한 프리미엄급 탈모증 치료제

PG 미함유, 보습제 덱스판테놀 함유

[원료약품 및 그분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) ..... 5.0g

### [효능·효과]

남성형 탈모증 (단, 5%는 남성에 한함)

### [용법·용량]

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약0.5mL~1mL를 1일 2회(아침,저녁) 최소 4개월동안 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 180mL, 360mL

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 3%



### [특·장점]

5%에 비해 부작용이 감소되어 예민한 여성의 두피에 맞춤형 제품

PG 미함유로 두피 트러블 최소화.

[원료약품 및 그분량] 100mL 중

미녹시딜(USP) ..... 5.0g

덱스판테놀(USP) ..... 1.0g

### [효능·효과]

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

### [용법·용량]

- 남성:** 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5~1mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안, 환부(질환부위)에만 바른다.  
 2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.  
 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.
- 여성:** 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안, 환부(질환부위)에만 바른다.  
 2) 1일 총 투여량이 1.3mL를 초과하지 않는다.  
 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

[포장단위] 60mL, 90mL, 180mL(리필용)

[저장방법] 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 S 캡슐



### 【특·장점】

남녀공용 비호르몬 성분의 먹는 탈모증 치료제 "1일 3회, 1회 1캡슐 복용"  
**【원료약품 및 그분량】 1캡슐 중**

|   |       |
|---|-------|
| 케라틴(별규) .....   | 20mg  |
| (총 아미노산으로서 L-트레오닌 2.97mg, L-페닐알라닌 2.41mg, L-이소로이신 2.70mg) |       |
| 약용효모(별규) .....  | 100mg |
| 질산치아민(KP) .....   | 60mg  |
| 판토탄산칼슘(KP) .....  | 60mg  |
| L-시스틴(KP) .....   | 20mg  |
| 파라아미노벤조산(USP) .....                                       | 20mg  |

### 【효능·효과】

1) 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진 2) 탈모의 보조치료

### 【용법·용량】

성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용 / 소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

**【포장단위】** 90C, 180C, 360C **【저장방법】** 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 겔 5%



### 【특·장점】

국내 최초 흐르지 않는 겔 타입  
 마사지가 가능한 미니 둥근머리  
 휴대가 간편하여 여행시 편리!

**【원료약품 및 그분량】 100mL 중**

|                 |      |
|-----------------|------|
| 미녹시딜(USP) ..... | 5.0g |
|-----------------|------|

### 【효능·효과】

남성형 탈모증(남성에 한함)

### 【용법·용량】

1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 약 0.5mL~1mL를 1일 2회(아침, 저녁) 최소 4개월 동안 환부에만 바른다.

2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

**【포장단위】** 15g **【저장방법】** 차광기밀용기, 상온보관(15~25℃)

## 마이녹실 겔 3%



### 【특·장점】

손델 필요없이 두피에 직접 바르세요. 흐르지 않아 위생적인 겔 타입  
 휴대가 간편하여 여행시 편리!

**【원료약품 및 그분량】 100mL 중**

|                 |      |
|-----------------|------|
| 미녹시딜(USP) ..... | 30mg |
|-----------------|------|

### 【효능·효과】

남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료

### 【용법·용량】

남성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5~1mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안, 환부(질한부위)에만 바른다.

2) 1일 총 투여량이 2mL를 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

여성 : 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월동안, 환부(질한부위)에만 바른다.

2) 1일 총 투여량이 1.3mL를 초과하지 않는다.

3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

**【포장단위】** 15g **【저장방법】** 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

## 등근머리 버물리겔



### 【특·장점】

흐르지 않고 흡수가 빠른 겔타입 제형!  
마사지 기능의 등근머리 용기, 벌레물려 가려울때 - 버물리

【원료약품 및 그분량】 100mL 중

|                     |      |
|---------------------|------|
| DL - 캄파(KP) .....   | 3g   |
| 살라실산메틸(KP) .....    | 3g   |
| L - 멘톨(KP) .....    | 3g   |
| 디부카인염산염(KP) .....   | 0.3g |
| 디펜히드라민염산염(KP) ..... | 2g   |
| 에녹솔론(KPC) .....     | 0.2g |

### 【효능·효과】

습진, 피부염, 미란(긁무름), 땀띠, 옷 등에 의한 접촉피부염, 가려움, 동상(안상처) 벌레물린데, 두드러기

### 【용법·용량】

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

【포장단위】 25g, 50g

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 등근머리 버물리키드크림



### 【특·장점】

연약한 피부의 유아와 여성을 위한 저자극 크림타입 제형  
생후 1개월 이상 사용가능

【원료약품 및 그분량】 1g 중

|  |      |
|--|------|
| 디펜히드라민(KP) .....                           | 10mg |
| 덱스판테놀(USP) .....                           | 10mg |
| 토코페롤아세테이트(KP) .....                        | 10mg |
| 글리시리진산이칼륨(KP) .....                        | 5mg  |
| 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1mg<br>파라옥시벤조산프로필 1mg |      |

### 【효능·효과】

가려움, 피부염, 피부병, 습진, 두드러기, 땀띠, 동상, 벌레물림, 긁무름

### 【용법·용량】

1일 수회(여러차례) 환부(질환부위)에 적당량을 바른다.

【포장단위】 25g

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

버물리에스액 스펀지타입



**[특·장점]**

벌레물림시장 No.1 브랜드 버물리!  
30개월 이상부터 사용할 수 있어요~  
오랜시간 사랑받은 우리가족 여름상비약!

**[원료약품 및 그 분량]** 100mL 중

|                     |         |
|---------------------|---------|
| DL - 캄파(KP) .....   | 30mg/mL |
| L - 멘톨(KP) .....    | 30mg/mL |
| 살라실산메틸(KP) .....    | 30mg/mL |
| 디펜히드라민염산염(KP) ..... | 20mg/mL |
| 디부카인염산염(KP) .....   | 3mg/mL  |
| 에녹솔론(KPC) .....     | 2mg/mL  |

**[효능·효과]**

습진, 피부염, 미란(긁무름), 땀띠, 옷 등에 의한 접촉피부염, 가려움, 동상(언상처)  
벌레물린데, 두드러기

**[용법·용량]**

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

**[포장단위]** 50ml

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

버물리에스액 솔타입



**[특·장점]**

가려울때 긁어주는 편리한 솔타입  
LDPE 특수재질로 부드럽고 위생적  
벌레물려 가려울 땀 - 버물리, 우리가족 여름 상비약 버물리

**[원료약품 및 그 분량]** 100mL 중

|                     |         |
|---------------------|---------|
| DL - 캄파(KP) .....   | 30mg/mL |
| L - 멘톨(KP) .....    | 30mg/mL |
| 살라실산메틸(KP) .....    | 30mg/mL |
| 디펜히드라민염산염(KP) ..... | 20mg/mL |
| 디부카인염산염(KP) .....   | 3mg/mL  |
| 에녹솔론(KPC) .....     | 2mg/mL  |

**[효능·효과]**

습진, 피부염, 미란(긁무름), 땀띠, 옷 등에 의한 접촉피부염, 가려움, 동상(언상처)  
벌레물린데, 두드러기

**[용법·용량]**

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

**[포장단위]** 50ml

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 버물 이카리딘케어



### [특·장점]

모기와 털진드기에 2.5시간 기피효과로 아웃도어 활동에 필수품목!  
생후 6개월부터 버물케어하세요!

**[원료약품 및 그 분량]** 100g 중

이카리딘(별규) ..... 7.0g

### [효능·효과]

모기, 털진드기의 기피제

### [용법·용량]

1) 모기 기피제로 사용시, 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량 분무한다.

2) 털진드기 기피제로 사용시 피부에 똑바로 세워 고루 분무한다.

**[포장단위]** 60mL

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 버물리 플라스타



### [특·장점]

붙이는 벌레물림 치료제 - 의약품 플라스타 제형

옷에 묻지 않아요. 투명하게 붙이세요!

해외여행 갈 때, 아웃도어 활동에 포켓에 쏙~!

**[원료약품 및 그 분량]** 1매 중

디펜히드라민(KP) ..... 0.493mg

이소프로핀메틸페놀(별규) ..... 0.493mg

L-멘톨(KP) ..... 1.478mg

### [효능·효과]

벌레물린데, 가려움, 동창(안 상처)

### [용법·용량]

1일 1~수회(여러차례), 1회 1매씩 환부(질환부위)에 붙인다.

**[포장단위]** 42매

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 더마화이트



### 【특·장점】

트라넥삼산을 함유한 신개념 기미전용 치료제  
기존 기미치료성분인 엘시스테인, 비타민C, 판토텐산칼슘에 강력한 미  
백성분인 트라넥삼산과 피리독신을 추가  
2개월 요법제로 복용시 만족스러운 치료효과를 기대할 수 있습니다.

### 【원료약품 및 그분량】 1정 중

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 트라넥삼산(KP)                       | 125mg |
| 제피아스코르브산(별규)<br>(아스코르브산으로 50mg) | 53mg  |
| 엘시스테인(JP)                       | 40mg  |
| 판토텐산칼슘(KP)                      | 4mg   |
| 피리독신염산염(KP)                     | 1mg   |
| 동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)       |       |

### 【효능·효과】 기미

### 【용법·용량】

15세 이상 1회 2정, 1일 3회 식후복용, 15세 미만은 복용하지 마십시오.  
용법/용량은 엄수하여 주시기 바랍니다.

【포장단위】 180정 x 2EA

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 등근머리 물팍스겔



### 【특·장점】

국내 최초 6가지 복합성분의 프리미엄 겔.  
야외활동이 많은 2030 Young People을 위한 등근머리 물팍스겔.  
뺨, 근육통, 타박상에 맞춤형 제품으로 청량감과 염증완화 효과.  
효과적인 마사지 기능의 등근머리 용기를 적용하여 손목, 발목 등 굴곡진  
부위도 부드럽게~

### 【원료약품 및 그분량】 1g 중

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 살리실산메틸(KP)      | 30mg  |
| d-캄파(KP)        | 80mg  |
| I-멘톨(KP)        | 70mg  |
| 클로르페니라민말레산염(KP) | 1mg   |
| 토코페롤아세테이트(KP)   | 1mg   |
| 에녹솔론(BP)        | 0.5mg |

### 【효능·효과】

다음 증상의 소염(항염)·진통 : 뺨, 타박상, 근육통, 요통(허리통증), 어깨결림  
신경통, 류마티스 통증, 동창(연 상처)

### 【용법·용량】

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.

【포장단위】 50g

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 히루도이드포르테겔



### [특·장점]

하지부종 및 혈행촉진, 보습 및 항염증 · 진통작용의 프리미엄 치료제

**[원료약품 및 그분량]** 100mL 중

뮤코폴리사카리드폴리설페이트(KP) ..... 4.45mg

### [효능·효과]

1. 정맥류에 의한 증상 : 통증, 무거운 느낌, 하지부종
2. 사고 또는 스포츠에 의한 둔상 : 혈종, 타박상, 염좌(뺨), 부기, 근육 및 인대의 통증

### [용법·용량]

성인의 경우, 1회 적용 시 이 약 3~5cm 정도를 환부에 바르며 1일 수회 바른다. 이 약을 바른 부위는 붕대로 감지 않는다.

**[포장단위]** 40g

**[저장방법]** 기밀용기, 상온(15~25℃)보관

## 등근머리 통에존에스겔



### [특·장점]

관절염, 근육통에 바르는 진통 · 소염제

**[원료약품 및 그분량]** 1g 중

피록시캄(KP) ..... 5mg

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1.8mg

파라옥시벤조산프로필 0.2mg

### [효능·효과]

퇴행성 관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건 · 건초염, 건주위염, 상완 골상과염(테니스엘보우)

### [용법·용량]

성인 1회 1g(약 3cm), 1일 3~4회 환부(질한부위)에 바르고 잘 스며들도록 가볍게 문지른다.

**[포장단위]** 50g

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

현대 물파스에프



**[특·장점]**

물파스의 원조 토끼표 물파스

**[원료약품 및 그분량]** 100mL 중

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 살리실산 메칠(KP) .....     | 3g    |
| d-캄파(KP) .....        | 7g    |
| I-멘톨(KP) .....        | 7g    |
| 클로르페니라민말레산염(KP) ..... | 0.1g  |
| 토코페롤아세테이트(KP) .....   | 0.1g  |
| 글리시레틴산(BP) .....      | 0.05g |

**[효능·효과]**

다음 증상의 소염·진통 : 뱀, 타박상, 근육통, 요통, 어깨걸림, 신경통, 류마티스 통증

**[용법·용량]**

1일 1회~수회 환부에 적당량을 바른다.

**[포장단위]** 88mL

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

현대 에어파스맥스



**[특·장점]**

빠른 소염·진통작용 분사력·청량감 강화, 사용이 간편한 원터치 캡

**[원료약품 및 그분량]** 100g 중

|                  |        |
|------------------|--------|
| I-멘톨(KP) .....   | 5.02g  |
| d- 캄파(KP) .....  | 4.71g  |
| 살리실산메칠(KP) ..... | 2.75g  |
| 디펜히드라민(KP) ..... | 0.063g |

**[효능·효과]**

뻘데, 멍든데, 타박상, 근육통 치료의 보조

**[용법·용량]**

1일 1회~수회 환부에 적당량을 바른다.

**[포장단위]** 200mL

**[저장방법]** 기밀용기, 화기를 피하여 냉소에 보관

## 시노카엔캡슐



### [특·장점]

코감기 전문 치료제

**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐 중

벨라돈나총알카로이드(별규) ..... 0.13mg  
(히오시아민으로서 0.1235mg)

클로르페니라민말레산염(KP) ..... 4mg

페닐레프린염산염(KP) ..... 3.33mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호

동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

### [효능·효과]

코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통(목구멍 통증), 머리 무거움

### [용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐 씩 1일 3회 식후 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 슬루샷쿨 연질캡슐



### [특·장점]

효과빠른 액상형 종합감기약

**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐(1,280mg)중

아세트아미노펜(KP) ..... 200.0mg

구아이페네신(KP) ..... 41.6mg

슈도에페드린염산염(USP) ..... 15.0mg

덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고 : 일수화물) ..... 8.0mg

클로르페니라민말레산염(KP) ..... 1.25mg

d-메틸에페드린염산염(KP) ..... 6.25mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호

### [효능·효과]

감기의 증상상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

### [용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 슬루샷코프 연질캡슐



### [특·장점]

효과빠른 액상형 목감기약

**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐(1,190mg)중

|  |         |
|--|---------|
| 아세트아미노펜(KP) .....                      | 200.0mg |
| 구아이페네신(KP) .....                       | 41.6mg  |
| 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고: 일수화물) ..... | 8.0mg   |
| d-메틸에페드린염산염(KP) .....                  | 12.5mg  |
| 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호                 |         |

### [효능·효과]

감기의 증상상(여러증상)(인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

### [용법·용량]

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 슬루샷노즈 연질캡슐



### [특·장점]

효과빠른 액상형 코감기약

**[원료약품 및 그 분량]** 1캡슐(1,190mg)중

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 아세트아미노펜(KP) .....       | 200.0mg |
| 슈도에페드린염산염(USP) .....    | 15.0mg  |
| 클로르페니라민말레산염(KP) .....   | 1.25mg  |
| 첨가제(타르색소): 황색203호, 청색1호 |         |

### [효능·효과]

감기의 증상상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

### [용법·용량]

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

**[포장단위]** 10캡슐

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 솔루펜 / 솔루펜 무색소



### 【특·장점】

강력한 진통효과, 신속한 효과발현. 위장장애 개선  
액상타입의 빠른 효과

### 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

덱시부프로펜(별규) ..... 300mg

### 【효능·효과】

급성 및 만성 관절염: 다발성 관절염, 류마티스성관절염 등  
염증성 류마티스 질환: 강직성 척추염, 근육 류마티즘, 외상 및 수술 후 통증성 부  
종 또는 염증, 염증, 통증 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조

### 【용법·용량】

성인: 1회 1캡슐을 1일 3~4회 식사시 경구투여

### 【포장단위】 10캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 시노코프캡슐



### 【특·장점】

디프로필린 처방의 기침감기 전문치료제

### 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

디프로필린(USP) ..... 37.5mg

d-메틸에페드린염산염(KP) ..... 3.1mg

덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)(비고:일수화물) ..... 10mg

디펜히드라민염산염(KP) ..... 7.5mg

첨가제(타르색소): 유당(소의 젖), 스테아르산마그네슘(소의 우지)

### 【효능·효과】

기침, 가래

### 【용법·용량】

연령(나이)에 따라 다음 용량을 1일 3회, 식후 30분에 복용하십시오.

만 15세 이상: 1회 2캡슐

만 11세 이상 ~ 만 15세 미만: 1회 1캡슐 (단, 만 11세 이상~만 15세 미만은 1일 4회 복용한다.)

만 8세 이상 ~ 만 11세 미만: 1회 1캡슐

### 【포장단위】 10캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 한생액 보틀형



### [특·장점]

다섯가지 생약성분이 함유된 한방기침약

**[원료약품 및 그 분량]** 100ml 중

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 맥문동 30% 에탄올 유동엑스(별규)          | 4.17mL  |
| 남천실 30% 에탄올 유동엑스(별규)          | 3.125mL |
| ( $\alpha$ -메틸도메스티신으로서 2.5mg) |         |
| 감초엑스(3→1)(별규)                 | 1,250mg |
| (글리시리진산으로서 93.8mg)            |         |
| 길경 33.3% 에탄올 유동엑스(4→1)(별규)    | 625mg   |
| 우황(KP)                        | 6.25mg  |
| (결합형 빌리루빈으로서 0.75mg)          |         |
| 구아아콜살폰산칼륨(KP)                 | 375mg   |
| d-메틸에페드린염산염(KP)               | 156.3mg |
| 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필          | 10mg    |

**[효능·효과]** 기침, 가래, 천식

**[용법·용량]**

성인 1회: 8mL / 소아 1회: 11세 이상~15세 미만: 5mL, 8세 이상~11세 미만: 4mL, 3세 이상~8세 미만: 2mL, 2세 이상~3세 미만: 1.5mL 1일 3회 복용한다. 1일 6회까지 복용할 수 있고 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

**[포장단위]** 75mL **[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 한생액 파우치형



### [특·장점]

다섯가지 생약성분이 함유된 한방기침약

**[원료약품 및 그 분량]** 100ml 중

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 맥문동 30% 에탄올 유동엑스(별규)          | 4.17mL  |
| 남천실 30% 에탄올 유동엑스(별규)          | 3.125mL |
| ( $\alpha$ -메틸도메스티신으로서 2.5mg) |         |
| 감초엑스(3→1)(별규)                 | 1,250mg |
| (글리시리진산으로서 93.8mg)            |         |
| 길경 33.3% 에탄올 유동엑스(4→1)(별규)    | 625mg   |
| 우황(KP)                        | 6.25mg  |
| (결합형 빌리루빈으로서 0.75mg)          |         |
| 구아아콜살폰산칼륨(KP)                 | 375mg   |
| d-메틸에페드린염산염(KP)               | 156.3mg |
| 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필          | 10mg    |

**[효능·효과]** 기침, 가래, 천식

**[용법·용량]**

성인 1회: 8mL / 소아 1회: 11세 이상~15세 미만: 5mL, 8세 이상~11세 미만: 4mL, 3세 이상~8세 미만: 2mL, 2세 이상~3세 미만: 1.5mL 1일 3회 복용한다. 1일 6회까지 복용할 수 있고 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

**[포장단위]** 8mL x 10포 **[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 스토마신캡슐



### 【특·장점】

구풍해독탕 배합, 생약성분의 항염증제

### 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 구풍해독탕건조엑스(별규) ..... | 685mg  |
| 방풍(KP) .....        | 500mg  |
| 우방자(KP) .....       | 500mg  |
| 연교(KP) .....        | 835mg  |
| 형개(KP) .....        | 250mg  |
| 강활(KP) .....        | 250mg  |
| 감초(KP) .....        | 250mg  |
| 길경(KP) .....        | 500mg  |
| 석고(생규) .....        | 1665mg |

동물유래성분 : 유당(젖소의 우유)

### 【효능·효과】

인후(목구멍)가 부어서 아픈 다음 증상 : 편도염, 편도주위염

### 【용법·용량】

보통 성인 1회 2캡슐, 1회 7~14세 성인 용량의 2/3(4/3캡슐), 4~6세 성인 용량의 1/2(1캡슐), 2~3세 성인 용량의 1/3(2/3캡슐), 1세 이하 성인용량의 1/4(1/2캡슐)을 1일 3회 식전 또는 식간에 미지근한 물에 녹여서 입이나 목 등을 적셔가면서 소량씩 천천히 복용한다. (캡슐로 삼키지 말 것.)

【포장단위】 10캡슐 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 속시탈 과립



### 【특·장점】

속이 탈다면 속시탈! 위통, 속쓰림, 소화불량

효과 빠른 과립형 위장질환 치료제 날개포 판매가능

### 【원료약품 및 그 분량】 약 1.5g 중

|  |       |
|--|-------|
| 말레인산트리메부틴(KPC) .....                   | 100mg |
| 비오디아스타제 2000IV(KPC) .....              | 40mg  |
| 리파제 II (KPC) .....                     | 15mg  |
| 감초가루 (KP) .....                        | 50mg  |
| (글리시리진산으로서 1.25mg)                     |       |
| 스코폴리아엑스(KP) .....                      | 10mg  |
| 침강탄산칼슘(KP) .....                       | 200mg |
| 메타규산알루미늄(건조물로서)(KPC) .....             | 80mg  |
| (산화알루미늄으로서 25.84mg, 산화마그네슘으로서 10.16mg) |       |
| 탄산수소나트륨(KP) .....                      | 100mg |

### 【효능·효과】

위산 과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 심트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

### 【용법·용량】

성인 : 1회 1.5g(1포) 씩, 1일 3회 식후복용

【포장단위】 1.5g x 30포 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

댄스탑 외용액



**[특·장점]**

비듬, 지루피부염, 어루러기

**[원료약품 및 그 분량]** 100mL 중

케토코나졸(USP) ..... 2g

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.1g, 파라옥시벤조산프로필 0.1g

**[효능·효과]**

효모균(Pityrosporum)에 의한 다음의 피부질환 : 비듬, 지루피부염, 어루러기

**[용법·용량]**

감염부위(몸통, 얼굴, 두피, 머리카락)에 이 약을 바르고 일반 샴푸처럼 3~5분 간 적용후 후 행구어 낸다.

**[포장단위]** 100mL

**[저장방법]** 차광기밀용기, 실온(1-30°C)보관

누보클렌액



**[특·장점]**

살균, 소독, 상처치료에 유효한 복합성분

**[원료약품 및 그 분량]** 100ml 중

클로르헥시딘글루콘산염(EP) ..... 1.0ml

(글루콘산클로르헥시딘으로서 0.2g)

디펜히드라민염산염(USP) ..... 0.3g

디부카인염산염(USP) ..... 0.1g

나피졸린염산염(약전) ..... 0.1g

알란토인(USP) ..... 0.2g

**[효능·효과]**

긁힌 상처, 베인 상처, 창상, 손과 손가락의 살균, 소독, 치질인 경우의 항문 살균 소독

**[용법·용량]**

1일 1~수회 적당량을 환부에 바른다.

**[포장단위]** 50mL

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 나프젠액



### 【특·장점】

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어 염증성변화를 수반하는 진균증에 탁월한 효과, 손·발톱 무좀까지 허가

【원료약품 및 그분량】 30ml 중

나프티핀염산염 ..... 10mg

### 【효능·효과】

다음의 피부진균증

- 1) 백선 : 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증 3) 어루러기 4) 조갑(손·발톱) 진균증

### 【용법·용량】

- 1) 피부진균증 : 1일 1회 환부를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱)진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

【포장단위】 30mL

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 나프젠크림



### 【특·장점】

항진균작용에 항염증작용까지 나타내어 염증성변화를 수반하는 진균증에 탁월한 효과, 손·발톱 무좀까지 허가

【원료약품 및 그분량】 30g 중

나프티핀염산염 ..... 10g

### 【효능·효과】

다음의 피부진균증

- 1) 백선 : 족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선
- 2) 피부칸디다증 3) 어루러기 4) 조갑(손·발톱) 진균증

### 【용법·용량】

- 1) 피부진균증 : 1일 1회 환부를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지른다.
- 2) 조갑(손·발톱)진균증 : 손·발톱을 짧게 깎고, 1일 1회 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바른다.

【포장단위】 30g

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 디나펜 플라스타



### [특·장점]

붙이는 관절염 치료제. 먹는 디클로페낙나트륨을 간편하게  
외상 후 부기제거에 효과적인 단 하나의 NSAID  
24시간 지속효과

**[원료약품 및 그 분량]** 약 1매(70cm<sup>2</sup>, 2.4g) 중

디클로페낙나트륨(BP) ..... 15mg

### [효능·효과]

- 1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 어깨관절 주위염
- 3) 힘줄 및 힘줄윤활막염 4) 힘줄주위염
- 5) 위팔뼈상과염(테니스 엘보 등)
- 6) 근육통(근,근막성요(허리)통증 등)
- 7) 외상(상처) 후 부기 및 통증

### [용법·용량]

성인(15세 이상) : 1일 1회 1매를 환부(질환부위)에 붙입니다.  
단, 15세 미만은 사용하지 않습니다.

**[포장단위]** 10매

**[저장방법]** 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

## 통에존 쿨 플라스타



### [특·장점]

관절 깊숙이 더 빠르게

**[원료약품 및 그 분량]** 1매 중

펠비낙(BP) ..... 35mg

### [효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염 :

- 1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 어깨관절주위염
- 3) 건·건초염 건주위염
- 4) 상완골상과염(테니스 엘보우 등) 5) 근육통
- 6) 외상후의 종창·동통

### [용법·용량]

약면의 바리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부에 부착

**[포장단위]** 10매

**[저장방법]** 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

## 플로스탑 플라스타



### [특·장점]

관절 깊은 곳의 통증까지 더 빠르고 시원하게

**[원료약품 및 그 분량]** 1매(10cm) 중

플루르비프로펜(KP) ..... 2.8571mg

### [효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염:

- 1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 어깨관절주위염
- 3) 건·건초염 건주위염
- 4) 상완골상과염(테니스 엘보우 등)
- 5) 근육통 6) 외상후의 종창·동통

### [용법·용량]

약면의 박리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부에 부착

**[포장단위]** 10매

**[저장방법]** 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

## 케프로텍 플라스타



### [특·장점]

빠르고 시원한 관절염 근육통 치료제

**[원료약품 및 그 분량]** 1매(10cm) 중

케토프로펜(KP) ..... 4.2857mg

### [효능·효과]

다음 질환 및 증상의 진통·소염:

- 1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 어깨관절주위염
- 3) 건·건초염 건주위염
- 4) 상완골상과염(테니스 엘보우 등)
- 5) 근육통 6) 외상후의 종창·동통

### [용법·용량]

약면의 박리지를 떼어낸 후 1회 1매를 1일 2회 환부에 부착

**[포장단위]** 10매

**[저장방법]** 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

## 오큐바이트 프리저비전



## [특·장점]

세계판매 1위! AREDS연구로 임상효과 입증, 눈 전문 고단위 항산화제

## [원료약품 및 그 분량] 1정 중

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 50% 초산투코페롤  | 200mg (비타민E로서 100 IU)        |
| 베타카로틴 10%   | 42.960mg (베타카로틴으로서 7.160 IU) |
| 아스트코르빈산 90% | 125.556mg (아스트코르빈산으로서 113mg) |
| 산화제이동       | 0.501mg (구리로서 0.4mg)         |
| 산화아연        | 21.658mg (아연으로서 17.4mg)      |

## [효능·효과]

눈의 건조함의 완화, 야맹증, 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화:  
어깨, 목 결림, 수족저림, 수족냉증

## [용법·용량]

1일 1회 1정을 복용하거나, 의사에 지시에 따라 복용한다.

## [포장단위] 120T

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관

## 루핑점안액 1회용



## [특·장점]

히알루론산 첨가 국내최초 OTC 인공누액

## [원료약품 및 그 분량] 1mL 중

|             |       |
|-------------|-------|
| 염화나트륨(JP)   | 7.4mg |
| 염화칼륨(JP)    | 1.3mg |
| 히프로멜로오스(JP) | 2mg   |

## [효능·효과]

눈의 피로, 누액(눈물)의 보조(눈의 건조)  
하드콘택트렌즈 또는 소프트렌즈 착용 시 불편감  
눈의 침침함(눈곱이 많을 때) 등

## [용법·용량]

1일 3~6회, 1회 1~3방울 점안(눈에 넣음)한다.

## [포장단위]

30EA, 36EA

## [저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 비타엑티브 연질캡슐



**【특·장점】** 육체피로회복, 체력저하개선, 빈혈예방 및 치료, 발육기, 임신, 수유기, 노년기

**【원료약품 및 그분량】** 1캡슐(1,370mg) 중

|   |                                      |         |
|---|--------------------------------------|---------|
| 셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 50μg)(별규)                | 푸르셀티아민(KP)                           | 6.00mg  |
| 38,462mg                                  | 푸마르산철(철로서 24mg)(KP)                  | 73.00mg |
| 시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 4.9μg)(KP)       | 리보플라빈부티레이트(KP)                       | 6.00mg  |
| 4.9mg                                     | 산화아연(아연으로서 4.02mg)(KP)               | 5.00mg  |
| β-카로틴현탁액 30% (β-카로틴으로서 6mg)(KP)           | 피리독신염산염(KP)                          | 3.00mg  |
| 20.00mg                                   | 황산제이구리(구리로서 0.5mg)(EP)               | 1.255mg |
| 비오틴(USP)                                  | 판토텐산칼슘(KP)                           | 20.00mg |
| 0.045mg                                   | 황산망간수화물(망간으로서 0.65mg)(USP(비고: 일수화물)) | 2.00mg  |
| 아스코르브산(KP)                                | 니코틴산아미드(KP)                          | 20.00mg |
| 100.00mg                                  | 산화마그네슘(마그네슘으로서 6.03mg)(KP)           | 10.00mg |
| γ-오리자놀(KP)                                | 폴산(KP)                               | 0.40mg  |
| 5.00mg                                    | 농축클레칼시페롤(유상)(비타민D로서 400IU)(BP)       | 0.40mg  |
| 토코페롤아세테이트(비타민E로서 200IU)(KP)               |                                      |         |
| 200.00mg                                  |                                      |         |
| 무수인산수소칼슘(인으로서 13.66mg, 칼슘으로서 17.67mg)(KP) |                                      |         |
| 60.00mg                                   |                                      |         |
| 유비데카레논(KP)                                |                                      |         |
| 5.00mg                                    |                                      |         |
| 첨가제(타르색소): 황색5호, 적색40호, 청색1호              |                                      |         |

**【효능·효과】**

- 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급
  - 육체피로 -임신·수유기 -병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
  - 발육기 -노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
  - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움) -뼈, 이의 발육불량 -구루병의 예방
- 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

**【용법·용량】** 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용  
**【포장단위】** 50캡슐, 100캡슐 **【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 루마콘300 연질캡슐



**【특·장점】**

콘드로이틴설페이트나트륨 강화 300mg  
 신경통, 근육통, 관절통, 요통, 건통, 어깨/목 결림, 수족저림, 수족냉증

**【원료약품 및 그분량】** 1캡슐(1,590mg) 중

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 콘드로이틴설페이트나트륨(KP)                   | 300mg |
| 티아민질산염(KP)                         | 25mg  |
| 토코페롤아세테이트(비타민E로서 50IU)(KP)         | 50mg  |
| 판토텐산칼슘(KP)                         | 30mg  |
| 니코틴산아미드(KP)                        | 30mg  |
| 피리독신염산염(KP)                        | 25mg  |
| 시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 30μg)(KP) | 30mg  |

마늘엑스(100→1)(생규) 2mg  
 첨가제(타르색소): 적색40호, 황색203호, 청색1호

**【효능·효과】**

- 다음 경우의 비타민 E, B1, B6의 보급: 1) 육체피로 2) 임신·수유기 3) 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 4) 노년기
- 이 약에 함유된 티아민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
  - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
  - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨통증)등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 -각기 -눈의 피로

**【용법·용량】** 만 8세 이상 어린이 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 씹 식후복용  
**【포장단위】** 60캡슐, 120캡슐 **【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 케라네일캡슐



### 【특·장점】

손톱의 발육부진, 국내 최초 손톱영양제 컨셉의 의약품  
 손톱무좀 치료제와 병용 사용시 빠른 효과  
 24시간 지속효과

### 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

약용효모(별규) ..... 100mg  
 케라틴(별규) ..... 20mg  
 (총 아미노산으로서 L-트레오닌 2.97mg, L-페닐알라닌 2.41mg,  
 L-이소로이신 2.70mg)  
 티아민질산염(KP) ..... 60mg  
 판토텐산칼슘(KP) ..... 60mg  
 L-시스틴(KP) ..... 20mg  
 p-아미노벤조산(USP) ..... 20mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 황색203호, 청색1호  
 첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

### 【효능·효과】

1) 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육부진 2) 탈모의 보조치료

### 【용법·용량】

성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용  
 소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

【포장단위】 63C x 2EA 【저장방법】 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

## 리버 350



### 【특·장점】

실리마린 고함량 간질환 치료제  
 카르두스마리아누스엑스 350mg(국내 최고함량)

### 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

밀크시슬엑스(KPC) ..... 350mg  
 (실리마린으로서 196mg)  
 첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호

### 【효능·효과】

다음 질환의 보조치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

### 【용법·용량】

1일 1회, 1회 1캡슐

### 【포장단위】

120C (60C x 2EA)

### 【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 칼로바이



### [특·장점]

- [녹차추출물] 항산화 작용·체지방 감소 효과·혈중 콜레스테롤 개선에 도움
- [알로에전잎] 배변활동 원활에 도움
- [비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지, 철의 흡수, 유해산소로부터 세포 보호에 필요
- [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
- [아연] 정상적인 면역기능, 정상적인 세포분열에 필요
- [셀레늄] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요

### [원료약품 및 그 분량] 1포 중

알로에베라추출물(알로에베라추출물분말, 말토덱스트린), 멕시코산), 녹차추출물(인도산), 비타민C, 건조효모(셀렌, 캐나다산), 산화아연, 판토텐산칼슘, 결정셀룰로스, 말토덱스트린, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 흰강낭콩추출물분말, 키토산분말, 사프란추출물분말, L-카르니틴, 울금추출농축액분말, 아미노산혼합제제(L-라이신염산염, L-트레오닌, L-로이신, L-발린, L-메티오닌, L-페닐알라닌, L-이소로이신, L-트립토판, 프락토올리고당) 대두, 새우 함유

**[용법·용량]** 1일 2회, 1회 1포(4정)를 물과 함께 섭취하십시오.

**[포장단위]** 120포

**[저장방법]** 직사광선을 피하여 습기가 적은 서늘한곳에 보관하여 주십시오.

## 헤모라민 필름형트로키



### [특·장점]

- 간편하게 물없이 녹여먹는 빈혈치료제
- 복약순응도 GOOD! 휴대가 간편하며 흡수가 빠릅니다.

### [원료약품 및 그 분량] 1장(112mg) 중

폴리말토오스수산화제이철착염(KP) ..... 50mg (철로서 14mg)  
 폴산(KP) ..... 150μg

### [효능·효과]

철결핍성 빈혈의 예방 및 치료

### [용법·용량]

1일 2회, 1회 1장을 씹거나 삼키지 말고 입안에서 천천히 녹여 복용한다.  
 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

### [포장단위]

4매 x 20EA

### [저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C)보관

## 헤파멜즈로라액



**[특·장점]**

독일 오리지널 LOLA(L-Omitine-L-Aspartate) 3,000mg 함유  
간해독 작용과 간세포 회복의 Dual-action  
만성피로와 집중력 저하 개선

**[원료약품 및 그 분량]** 1병 (30mL) 중

L-아스파르트산-L-오르니틴(DAB) ..... 3g

**[효능·효과]**

다음의 중증의 간질환 해독의 보조치료 : 간경변, 만성간염

**[용법·용량]**

1. 만성간염 : 심한 증상에서 L-아스파르트산-L-오르니틴으로서 1회 3g, 1일 1~2회 식후에 복용한다.
2. 간경변 : 가벼운 증상에서 L-아스파르트산-L-오르니틴으로서 6g 1일 2회 많은 양의 물에 녹여 식후에 복용한다.

**[포장단위]**

30mL x 100BTL

**[저장방법]**

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 바로테스트 센스



**[특·장점]**

Whole hCG 검출법을 적용한 High Quality 제품.  
불량을 0%에 도전하는 고품질 임신 진단시약

**[원료약품 및 그 분량]** 1테스트 중

마우스 항 hCG 단일클론항체1 (체외진단용) ..... 0.15± 0.03µg

마우스 항 hCG 단일클론항체2 (체외진단용) ..... 0.8± 0.16µg

항 마우스 면역글로불린지 (체외진단용) ..... 1.0± 0.2µg

**[효능·효과]**

노종의 hCG(Human Chorionic Gonadotropin)검사를 통한 임신의 진단

**[용법·용량]**

생리에정일 7일 이후에 검사 실시

**[포장단위]**

1키트

**[저장방법]**

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 라니아정



## 【특·장점】

사후피임약 No.1 노래보의 현대약품이 만든 순한 피임약  
에스트로겐 함량 최저, 오심, 구토, 복부 팽만감 등 부작용 최소화  
2세대 피임약의 혈전생성을 최저

## 【원료약품 및 그 분량】 1정 중

레보노르게스ترل(EP) ..... 0.1mg  
에티닐에스트라디올(EP) ..... 0.02mg  
첨가제(타르색소) : 알루라레드 AC 알루미눔레이크  
인디고카르민 알루미눔레이크

첨가제(동물유래성분) : 유당(소의 우유)  
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.1g, 파라옥시벤조산프로필 0.1g

## 【효능·효과】

피임, 이 약을 복용할 수 있는 여성의 중등도의 여드름 치료

## 【용법·용량】

1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용중지)한다.

매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.

(자세한 내용은 첨부문서를 참조하십시오.)

## 【포장단위】 21정

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관

## 보니타정



## 【특·장점】

머시론 1st 제네릭 제품(최초, 유일)  
에스트로겐 함량 최저  
3세대피임약으로 부종, 다모, 우울감 등 최소화

## 【원료약품 및 그 분량】 1정 중

데스게스ترل(별규) ..... 0.15mg  
에티닐에스트라디올(별규) ..... 0.02mg  
첨가제(타르색소) : 알루라레드 AC 알루미눔레이크  
인디고카르민 알루미눔레이크

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)

## 【효능·효과】

피임

## 【용법·용량】

1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용중지)한다.

매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋다.

(자세한 내용은 첨부문서를 참조하십시오.)

## 【포장단위】 21정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

## 현대 아시클로버 크림



## 【특·장점】

구순포진, 생식기포진, 각종 바이러스 질환에 현대약품 아시클로버

## 【원료약품 및 그분량】 1g 중

아시클로버(BP) ..... 50mg

## 【효능·효과】

단순포진 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진과 구순포진 포함)

## 【용법·용량】

1. 이 약은 약 4시간 간격으로 1일 5회 환부(질환부위)에 바른다.
2. 치료는 5일 간 계속하여야 하며, 5일 간 사용 후에도 치료되지 않을 경우에는 5일 간 더 사용 할 수 있다.

## 【포장단위】

5g

## 【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 트랜스이엑스겔



## 【특·장점】

고품질 수용성 윤활 젤리 겔타입

질내 건조증을 가진 여성분들에게 적합한 윤활제

## 【원료약품 및 그분량】 1g 중

글리세린(KP) ..... 170mg/g

## 【효능·효과】

직장온도계, 탐폰, 기타기구(관장기, 관주기, 카테타 등)의 체강내 삽입시의 윤활제, 질내 윤활제

## 【용법·용량】

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 줌.

## 【포장단위】

100g

## 【저장방법】

실온보관, 기밀용기, 3년

## 블리스텍스 센시티브



### [특·장점]

코코아버터와 시어버터 추출물 함유  
민감한 입술에 저자극성 보습효과

### [전성분]

페트롤라툼, 카카오씨드버터, 하이드록시스테아릭에씨드, 쉐어버터, 페녹시에탄올

### [효능·효과]

민감한 입술에 저자극성의 보습 효과와 편안함 제공

### [용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 줌.

### [포장단위]

4.25g

### [유통기한]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

## 블리스텍스 딥 리뉴얼



### [특·장점]

코엔자임큐텐, 히알루론산 함유로 건강한 입술 유지  
탁월한 보습효과

### [전성분]

호호바에스터, 캐스터씨유, 다이메티콘, 비즈왁스, 민트오일, 마이크로크리스탈린왁스

### [효능·효과]

튼 입술의 보호와 수분 공급을 통한 재생 효과

### [용법·용량]

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 줌.

### [포장단위]

3.7g

### [유통기한]

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

## 블리스텍스 체리향



## 【특·장점】

풍부한 보습을 돕는 Shea버터 성분 함유로 보습효과 및 입술보호  
가장 인기많은 달콤한 체리향의 크림타입 제형 립밤

## 【전성분】

정제수, 하이드로제네이티드폴리아이소부텐, 비즈왁스, 페트롤라툼, 에칠헥실메  
톡시신나메이트, 향료, 폴리글리세릴-3다이아아이스테아레이트, 솔비탄아이스스  
테아레이트, 하이드로제네이티드소아폴리글리세라이드 C 15-23알케인, 글리세  
린, 폴리솔베이트60, 세틸알코올스테아릴베헤네이트, 다이메티콘, 페녹시에탄올,  
하이드레이티드실리카, 아라키딜알코올, 베헤닐알코올, 아라키딜글루코사이드,  
라놀린알코올, Shea버터, 솔비탄올리베이트, 소듐하이드록사이드, 알란토인, 미리  
스틱애씨드, 팔미틱애씨드, 올레익애씨드, 라우릭애씨드, 포스포릭애씨드소듐사  
카린, 시트릭애씨드, 칼슘다이소듐이디티에이

## 【효능·효과】

수분공급을 통한 보습 및 입술 보호

## 【용법·용량】

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 줌.

## 【포장단위】

6mL

## 【유통기한】

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

## 블리스텍스 릴리프 립크림



## 【특·장점】

튼 입술 보호와 수분공급을 통한 재생 효과  
탁월한 치료 효과, 탁월한 흡수력과 지속력  
자외선 차단 효과

## 【전성분】

알란토인, 옥시벤존, 페디메이트, 비즈왁스, 라놀린, 미네랄오일, 육계나무잎  
추출물, 페퍼민트 오일

## 【효능·효과】

튼 입술의 보호와 수분 공급을 통한 재생 효과

## 【용법·용량】

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 퍼 줌.

## 【포장단위】

6mL

## 【유통기한】

제조일로부터 3년(제조일자 제품밀면 표기)

## 블리스텍스 립 바이브런스



### **[특·장점]**

입술의 톤을 살려주는 아름다운 색조와 펄의 조화  
강력한 고보습 제품

### **[전성분]**

다이메티콘, 옥시벤존, 옥티녹세이트, 향료, 미네랄오일,  
마이크로크리스탈린왁스, 아주까리씨유, 포도씨유

### **[효능·효과]**

강력한 보습효과로 민감한 입술의 보호

### **[용법·용량]**

적용 부위에 적당량을 바른 다음, 부드럽게 문질러 펴 줌.

### **[포장단위]**

3.69g

### **[유통기한]**


제조일로부터 3년(제조일자 제품일면 표기)

## 1. 국내 제약업계 최초로 CCM 재인증

지난 2008년 “소비자 중심경영(Consumer Centered Management : 이하 CCM)” 을 도입, 소비자 불만을 사전에 예방하고 신속하게 사후구제를 처리할 수 있는 내부실행체계를 구축하여 소비자만족에 앞장서 왔던 현대약품(주)은 2008년 제약업계 최초 CCM인증에 이어 2018년에 5차 재인증을 받음으로 명실상부히 소비자 신뢰를 얻는 회사로서의 이미지를 굳건히 하였습니다.



## 2. 현대약품(주) CCM의 특징

현대약품(주) CCM(소비자 중심 경영 프로그램)은 소비자에게 불만이나 피해가 발생할 경우 현대약품(주) 내부에서 신속, 정확하게 소비자 문제를 해결하고 이를 소비자와 소통하는 것을 목표로 설정하여 이를 시행하고 있습니다.



## 3. CCM 인증서

제약업계 최초 CCM 우수기업 2018년 5차 재인증 (18년 12월)  
CCM(소비자 중심경영 프로그램) 우수기업 인증 (공정거래 위원회)



**현대약품 강남본사**

서울특별시 강남구 봉은사로 135, 현대약품빌딩  
1666-9979

**현대약품 서부지점**

서울특별시 강서구 양천로 588, 3층  
02-3662-2411

**현대약품 충청지점**

대전광역시 중구 계룡로 786, 사학연금회관 504호  
042-541-6672

**현대약품 부산지점**

부산광역시 금정구 중앙대로 1925, 금정타워 7층  
051-516-7342

**현대약품 중부지점**

서울특별시 광진구 능동로 247, 유원빌딩 4층  
02-3662-2411

**현대약품 동부지점**

경기도 군포시 고산로 148길 17, 군포II밸리 B동 1901호  
031-8086-7191

**현대약품 광주지점**

광주광역시 광산구 하남대로 148, 2층  
062-951-6672

**현대약품 대구지점**

대구광역시 수성구 들안로 149, 3층  
053-761-9305

